





# 104469 R

### военно-медицинскій

## ELE LES TEN

**ИЗДАВАЕМЫЙ** 

#### МЕДИЦИНСКИМЪ ДЕПАРТАМЕНТОМЪ ВОЕННАГО МИНИСТЕРСТВА.

#### Часть XXX. № 2.

Discere ne cessa: cura sapientia creseit:
Rara datur longo prudentia temporis usu.
Cato.

### Caurthetepbyppb.

въ типографіи иверсена.

1857.

Kart Kara

Comparation of the comparison of the comparison

УСПЪШНОЕ ПЕРЕВЯЗАНІЕ ARTERIAE ILIACAE COM-MUNIS, БЛИЗЬ РАЗДЪЛЕНІЯ AORTAE ABDOMINALIS, ПРИ АНЕВРИЗМЪ ARTERIAE ILIACAE EXTERNAE, ПРО-ИЗВЕДЕННОЕ ПРОФЕСС. Х. САЛОМОНОМЪ.

Л. П., рядовой инвалидной Команды, 38 льтъ и здороваго тълосложенія, предавался пьянству, и въ прежнее время страдалъ перемежающеюся лихорадкою; а за десять льтъ предъ симъ, онъ имълъ, на головкъ мужескаго уда, первоначальную венерическую язву; посль чего, въ львой сторонь, развился венерическій пахопаховой викъ, который перешелъ въ нагноеніе, и оставиль посль себя большой рубець. Съ тъхъ норъ. Л. П. оставался здоровъ; но за щесть, или болье мъсяцевъ предъ симъ, лошадь, копытомъ своимъ, нанесла ему ударъ въ лъвую паховую сторону; вскоръ послъ этого поврежденія, образовалась, на мьсть ушиба, опухоль, которая, постепенно увеличиваясь, препятство-

вала хожденію, а впрочемъ мале больла. Но, почти за мъсяцъ предъ симъ, опухоль вдругъ начала быстро возрастать, и съ тъхъ поръ Л. П. принужденъ былъ уже лежать въ постели. Мая 24-го числа, 1837 года, больной этоть нзъ Госпиталя переведенъ въ Хирургическую Клинику; здъсь оказалось, что большая опухоль, въ львой паховой сторонь, не имьла точныхъ границъ, и отъ Пупарціевой связки простиралась, по внутренней сторонъ бедра, на четыре поперечныхъ перста ниже и выше этой связки, въ брющино нолость, продолжаясь, съ наружной стороны, до верхней передней ости подвздошной кости (spina auterior et superior ossis ilii) и даже несколько выше, а съ внутрешней стороны и въ направления къ бълой полосъ: (linea alba), доходя до самаго соединенія меннаго (symphysis essium pubis). Покровы на опуколи, ни мало не изменившись въ цветь, были сильно растянуты. Сильное біеніе, во всей опухоли, нетолько авственно ощущалось, но даже эръніемъ могло быть различаемо. Наиболье же сильное біеніе замьчалось, почти на два поперечныхъ нерета, выше lig. Poupartii и кнутри, гдъ нокровы оказались весьма напряженные и истоиченные. На этомъ мысты, во

время приложенія перстовъ нь опухоли, замьчалось особенное журчаніе, а чрезъ Стетоскопъ слышень быль ніумь, какь бы оть раздувательнаго мъха. Въ брюшную полость опухоль эта простиралась по теченію arteriæ iliacæ externæ, такъ что могла быть преследуема до самаго начала артеріи этой. Чрезъ придавливаніе аотіж abdominalis къ поясничнымъ позвонкамъ, біеніе въ опухоли прекращалось, и самая опухоль уменшилась въ объемъ. Больной удерживалъ бедро въ полусогбенномъ положения, и каждая понытка къ выпрямленію бедра причиняла ему весьма сильныя боли; кромъ того, онъ чувствоваль, на внутренней сторонь больнаго бедра, раздирающія боли, простиравшілся даже до внутренней стороны кольна и до икры; безпрерывно страдая, онъ убъдительно просиль е томъ, чтобы его освободить отъ жестокихъ мучевій. Пульсъ былъ скорый, твердый и полный; сильныя боли и безсонница, изнурили больнаго; впрочемъ, дыханіе совершалось свободно, а біеніе сердца было скорое и сильное, однакожъ непрерывистое.

Итакъ опухоль эта была не иное что, какъ anevrisma arteriae iliacae externae spurium, воспослъдовавшее отъ ушиба. Въроятно мъщокъ этой аневризмы въ послъдстви

разорвался, и былъ причиною столь быстраго и значительнаго увеличенія опухоли.

Вскоръ по принятіи этого больнаго въ Хирургическую Клинику, сдълано ему кровопусканіе до трів и назначена mixtura nitrosa с. tart. ететісо et aqua laurocerasi, а къ самой опухоли приложены холодныя примочки. Такъ какъ больной соглашался на всякую операцію, и даже требовалъ этого, и какъ притомъ не было никакого сопряженія: то я рышился на перевязаніе arteriæ iliacæ communis.

Операція эта въ первый разъ, какъ извъстио, сдълана Моттомъ, въ Филадельфіи; потомъ произвели оную: при аневризмъ arteriae iliacae ехternae, Крамптонъ, въ Дублинъ, и при fungo haematode, почти за два года предъ симъ, Гутри, въ Лондонъ.

Прежде самаго производства операціи, я о необходимости ея увъдомиль Его Превосходительство, Г. Президента Академіи, Баронета Я. В. Вилліе. Соизволяя на это, Его Превосходительство присовокупиль, дабы я предварительно имъль совъщаніе съ другими Врачами, которые бы также признали необходимость сказанной операціи, и присутствовали при самомъ производствъ ея. Сверхъ того, посль операціи

Его Превосходительство посвіщаль этого больнаго, и имъль особенный надзоръ надъ дальнъйшимъ леченіемъ его. Съ чувствомъ искреннъйшей благодарности, воспоминаю особенное участіе, оказанное Его Превосходительствомъкакъ въ семъ, такъ и въ другихъ трудныхъ случаяхъ, встрътнвшихся въ Хирургической Клиникъ.

Итакъ я имелъ совещание съ Дейст. Ст. Севетникомъ Професс. Бушеля, Лейбъ-Медикомъ Арендтомя, и Професс. Буяльскимя, которые вполне согласились со много, и операцію эту признали единственнымъ средствомъ късохраненію жизни больнаго.

Аневризматическая опухоль была весьма близка къ разрыву; а потому 26-го Мая я приступиль уже къ операціи, и произвель оную въ присутствіи Гг. Буша, Арендта, Буяльскаго, Зейдлица, Беверлея, Сахарова, Петрова и н. др., а также при студентахъ Медико-Хирургической Академіи. Адъюнткъ—Профессоръ Клиники Рклицкій пособляль мнъ при этомъ.

Больному дано было горизонтальное и укрыпленное положение на операціонномъ столь; посль того я сдылаль, на львой сторонь брюха, разрызь брюшныхъ покрововъ, который въ разстояніи почти 1— 11/2 дюйма кнутри отъ верхней передней ости модвадоминой кости, и на равной этой ости высотв, начать быль, отсюпроведень въ параллельномъ съ arteria epigastrica infer. направленіи и оконченъ почти на одинъ поперечный перстъ ниже послъдияго ложнаго ребра. Разръзъ этотъ, въ длинъ. нивль около 4 — 41 дюймовъ. Посль того, въ такомъ же направленія, fascia superficialis и мясистая часть трехъ, за нею следующихъ, брюшныхъ мышицъ, разръзаны были, частію. непосредственно, снаружи внутрь, помощію скалпеля, частію же, въ близи брюшины, по. жолобоватому зонду. За симъ, приподнявъ fasсіат ргоргіат и вскрывь се плоско приложеннымъ скалпелемъ, я ввель подъ оную жолобоватый зондъ и разширилъ разръзъ. Теперь обнаружилась брюшина, которую я, посредствомъ указательныхъ перстовъ моихъ, сперва отъ fascia musculi iliaci interni, а потомъ отъ musc. psoate отдълилъ, направляя мон персты отъ средины раны внутрыкь нижнимь поясничнозвонкамъ, и сколько можно болъе, остерегаясь отъ лишняго раздъленія приращеній брющины. Далье, помощникъ мой указательнымъ перстомъ своимъ удерживалъ, кверху и вправо, брюшину съ кипнами, а я, раздъляя

приращенія брюшины въ глубинь, безпренятственно дошель до arteria iliaca communis, которая представилась мив, на ощунъ, какъ натянутая веревка, имъющая явственное біеніе; она найдена въ здоровомъ состояніи. Теперь я, частію, указательнымъ перстомъ моимъ, осторожно отделиль эту артерію отъ вены, предварительно удостовърившись, чрезъ ощупъ, въ направленіи и положеніи сосуда сего (ибо видъть эту артерію я не могъ, по причинъ глубокаго положенія ел); частію же, помощію тупой аневризматической иглы, по львому указательному персту проведенной въ глубину раны, я изолироваль малую частицу этой артеріи, снутри и потомъ спаружи, дабы, вмъсть съ артеріею, не перевязать лаваго мочеточника, или нервныхъ вътвей. (Я долженъ однакожъ замътить, что мочеточникъ съ брюшиною, безпрерывно кверху поддерживаемы и чрезъ то удаляемы были отъ артеріи; но можетъ случиться, что артерія эта виъсть съ брюшиною приподнимается изъ своего положенія, какъ-то встрътилось Г. Гутри; а потому нужно обращать внимание на это обстоятельство. При произведенной мною операціи, артерія эта осталась въ надлежащемъ своемъ положения, и я безъ

всякаго затрудненія ощущаль в изолироваль ее въ глубинъ). Послъ сего, посредствомъ Арендтовой упругой аневризматической иглы, я снутри кнаружи обвель вокругь артеріи довольно кръпкую, круглую, шелковую лигатуру, и за тамъ удалиль иглу. Увърившись въ томъ, что чрезъ притягивание кондевъ лигатуры біеніе въ опухоли прекращается, я затянуль узель, обращая притомъ особенное внимание на надлежащее, со стороны 'помощника, поддерживание брюшины и удаленіе ся отъ артеріи. Оба конца лигатуры, кратчайшимъ путемъ, проведены были кнаружи. Немедленно прекратилось біеніе въ опухоли, вмъстъ съ симъ значительно уменшившейся въ объемъ своемъ. Замътить еще нужно, что, при обведенін иглы вокругь артерін и при затягиваніи лигатуры, не встрътилось ни мальйшее затрудненіе. Наружная рана соединена полосками липкаго пластыря, покрыта небольшимъ слоемъ корпіи и компрессами и укръплена была Т — образною повязкою. Во время операціи, больной потерялъ весьма мало крови, и я не имълъ надобности въ перевязкъ какого-либо кровоточащаго сосуда. Больному, перенесенному въ постель, доставлено было горизонтальное положение на спинъ съ нолусогнутыми, бедромъ и голенью.

Какъ операція эта неоспоримо принадлежить къ труднъйшимъ, то я намъренъ присовокупить нъкоторыя практическія замьчанія. Трудность операціи этой происходить наиболье отъ глубокаго положенія arteriae iliacae communis въ брюшной полости; посему стараться надобно облегчить себь путь къ этой артеріи, обращая притомъ особенное внимание на то, чтобы, сколько можно, менъе отдълить брюшину отъ задней брюшной стъны. Чрезъ многократныя упражненія на трупъ я вполнъ убъдился, что вышеупомянутый разрызь чрезь брюшную ствну, проводимый параллельно съ arteria epigastr. infer., есть самый выгодный, съ наибольшимъ сбереженіемъ брюшины сопряженный, и незатрудняющій отъискиванія arteriæ iliacæ communis. Извъстно, что Валентинъ Мотть производиль полулунный разрызь въ брюшной стынь, подобный тому, который Астли Куперома справедливо похваляется для перевязанія arteriæ externae; но Momms дълалъ разръзъ выше и длиннъе. Другіе похваляютъ разръзъ въ близи гребешка подвздошной кости; однако этотъ разръзъ весьма затрудняеть нетолько отъискание артеріи, но и обведение иглы вокругъ ея; вмъсть съ симъ, надобно здъсь

брюшину на гораздо большее разстояние отдълить отъ брюшной станы; посему разрызъ такой кажется мнъ вовсе пеудобнымъ. Стевенсъ, при перевязаніи arteriae hypogastricae, двлаль въ брюшной стана, только на <sup>1</sup>/2 дюйма отстоящій отъ arteria epigastrica infer.; при семъ надобно остерегаться, чтобы не доходить до сухожильного растяженія брюшныхъ мышицъ, которое весьма плотно соединено съ Ерюшиною, и не легко можеть быть отделено оть оной; кромь того, нужно, сколько можно, избъгать излишняго отдъленія брюшины отъ передней брюшной станы. При отдалении брюшины отъ fascia iliaca, надобно остерегаться, чтобы брюшину кзади отдълять не слишкомъ глубоко, а вмъсто того, стараться прямо дойти до musc. psoas major. Для обнаженія arteriae iliacae communis кратчайшимъ путемъ, считаю не маловажнымъ еще и то, чтобы брюшину отдълить не снизу кверху, въ косвенномъ, -- но, сколько можно, въ ноперечномъ, направленіи, спаружи внутрь. Въ описываемомъ здъсь случать преслъдовать это направление еще болье нужно было, для того чтобы не обнажить мъаневризматической опухоли, и чрезъ то не подать повода къ воспаленію его.

По окончанія операціи, больной почувствоваль весьма большое облегченіе; сильныя раздирающія боли въ бедрь и кольнюмъ составъ значительно уменшились. Въ нижней конечности оказалось чувство оглушенія, и температура ея, въ первые часы послъ операціи, значительно уменшилась. На конечность эту належены мъшечки съ нагрътыми отрубями, и къ ногамъ приставлевы теплыя бутылки.

Вечеромъ, 26-го Мая. Пульсъ скорый и твердый; впрочемъ, больной былъ спокоенъ. Для предотвращенія воспаленія и облегченія febr. vulnerariae, сдълано кровопусканіе до зхју; внутръ, чрезъ каждые три часа, давалось aquae laurocerasi gutt. xv; для питья стемог tartari, растворенный въ водъ.

Мая 27-го. Больной мало смаль; febris vulneraria умъренная, и общее состояніе больнаго довольно благопріятное.

Мая 28-го. Пульсъ лихорадочный; по причинь запора на низъ, больной принялъ столовую ложку olei ricini, и имълъ достаточное испражнение киппечное. Нижняя конечность была теплая; на внутренией сторонъ колъннаго состава возникла боль съ припухлостію мягкихъ частей, съ возвышеніемъ температуры и неболь-

щою краснотою кожи. Къ этому мъсту приставлено 10 піявокъ и приложены теплые мъщечки изъ spec. emollient. c. hb. hyoscyami.

Ман 29-го. Воспалительная опухоль въ кольнномъ составъ уменшилась. Въ сторонъ кольнной косточки, температура покрововъ весьма
уменшилась, и цвътъ ихъ былъ ослъпительнобълый. На этомъ мъстъ произведено втираніе
linim. volat. camphorati. На наружной поверхности ноги, въ сторонъ ossis metatarsi digiti
quinti, образовался поверхностный, омертвълый
струпъ (eschera sphacelosa), который примачиваемъ былъ согрътымъ oleo terebinthinae с.
врігіти сатрногато; прочія части ноги оставались теплыя. Общее состояніе было благопріятное; пульсъ менье скорый; больной спалъ
нъсколько часовъ. Аqua laurocerasi оставлена,
и только питье изъ стет. tartari назначено.

Мая 30-го. Больной спаль спокойно и чувствоваль гораздо болье бодрости силь; пульсь ударяль 80 разъ въ минуту, и быль мягкій. Кожа мягкая; температура тъла правильная; языкъ чистый; свободное испражненіе низомъ. Лъвая нижняя конечность оставалась теплою; опухоль аневризматическая значительно уменшилась въ объемъ; перевязка была снята; рана оказалась въ весьма хорошемъ состояніи; большая часть ея соединилась чрезъ слипчивое воспаленіе, такъ что только въ сторонъ лигатуры была еще открыта, и отдъляла умъренное количество доброжачественнаго и пластическаго гноя. Опухоль въ коленномъ составъ омять начала бометь; а нотому приставлено къ ней 12 піявокъ.

Мая 31-го. Вольной, ночью, спаль хорошо, и общее состояние ето было хорошее. Воспалительная опухоль въ кольнномъ составь уменшилась. Омертвелое пятно на плюсив ограничилось. Небольшой омертвелый струпъ, съ рожевиднымъ воспалениемъ покрововъ, образовался также надъ кольнною косточкою. Рана отделяла доброкачественный гной.

Іюня 1-го. Рана чистая. На кольнную косточку положены мышечки съ разрышающими травами.

Іюня 2-го. Воспалительная опухоль въ кольнномъ составъ опять начала сильнъе больть; снова приставлено къ ней 12-ть піявокъ, послъ чего воспаленіе это разръшилось. На подошвъ, болье кнаружи, появился также поверхностный омертвълый струпъ, занимающій небольшое пространство кожи. Общее состояніе больнаго было хорошее. Рана отдъляла доброкачественный гной.

Что касается до дальныйшаго теченія бользии, то, для избыжанія повтореній, прибавлю,
только, что съ этого времени больной постепенно поправлялся, нолучаль больше силь и
имыль хорошій сонь и аппетить, Аневризиатическая опухоль значительно уменцилась вы
объемь, такь что, въ конць Іюня, осталась только четвертая часть ея, превратившаяся въ
твердую массу. Температура больной конечности, равно какъ и чувствительность ея, была
правильная; чувство оглушенія оставалось
только въ большомъ перств и подошив. Омертвылые струпья, на кольнной косточкъ, плюснъ,
а равно и на подошяв, начали отдыляться.

На 23-й день послъ перевязанія arteriae iliaeae communis, лигатура, прежде сего уже отдълившаяся отъ этого сосуда, выступила изъраны и была удалена.

Посль операціи, вниманія достойно было, во нервыхъ, то, что въ кольнномъ составь развилось воспалительное противодъйствіе, потребовавшее многократнаго приставленія піявокъ; во вторыкъ, что, на второй недъль, въ кольнномъ составъ, икръ и подошвъ, появились силь-

ныи жгучія боли, ожесточавшіяся особенно ночью. При тщательномъ продолженіи втираній изъ ol. hyoscyami c. ung. mercur. и extr. bellad., боли эти мало по малу утихли послъ 8—10 дней. Боли этого рода въ конечности безъ сомнънія происходили отъ измъненнаго кругообращенія крови, и отъ наполненія и растяженія соединительныхъ сосудовъ кровью. Для уменшенія бользненно возвышенной чувствительности въ конечности, и для доставленія спокойнаго сна больному, ежедневно, въ продолженіе недъли, на ночь назначался одинъ гранъ опія съ ревенемъ.

По прошествій двухъ мъсяцевъ, рана совершенно срослась. Чрезъ три мъсяца, язвы, по отдъленіи струпьевъ, почти вовсе закрылись. На томъ мъсть, гдъ находилась аневризматическая опухоль, замъчалась еще малая, едва примътная, твердоватая опухлость, не причиняющая однакожъ никакого препятствія при движеніи конечности.

Благополучный исходъ операціи этой есть следственно новымъ доказательствомъ того, что, при аневризматическихъ опухоляхъ arteriae iliacae externae, перевязаніе arteriae iliacae communis назначается, и успъщно можетъ

быть производимо. Валентинь Мотть первый артерію эту успашно перевязаль при аневризма arteriae iliacae externae. И этотъ благополучный случай досслъ оставался единственнымъ. Послъ того, при такомъ же состояніи больнаго, операцію эту произвель Крамптонь; но, на восьмой день послъ операцін, больной умерь отъ последственнаго кровотеченія. Гутріевг случай, гдъ fungus haematodes признанъбылъ за аневризму arteriae iliacae externae, имълъ также смертельный исходъ. Что касается до перевязанія arteriae femoralis, или arteriae iliacae externae, при аневризматическихъ опухоляхъ arteriae iliacae externae производимаго, по способу Браздора, ниже самой опухоли: то, какъ извъстно, операція эта произведена сперва Дешампомь, потомъ Астли Куперомь (1818 г.), Вайтомъ (1827 г.) и Джемсомъ (1829 г.); но исходъ всъхъ сихъ операцій быль неблагополучный.

#### II.

ОБЗОРЪ БОЛЪЗНЕЙ, ВЪ ВОЙСКАХЪ 7-й ПЪХОТ-НОЙ ДИВИЗІИ, СЪ 1-го НОЯБРЯ 1835 ПО 1-е НОЯ-БРЯ 1856 ГОДА.

Сост. Корпуси. Докторомъ, Надв. Совыти. Булгаковыми.

(Сообщ. военно-медиц. Коминистомъ, учрежденнымъ при Главной Кварширъ Дъйств. Арміи).

Бользни, въ этомъ году, вообще имъли характеръ: воспалительный и гастрическій. Но, при сихъ главныхъ свойствахъ своихъ, онъ обнаруживались въ многоразличныхъ видахъ, или свойственныхъ имъ, особенныхъ формахъ, зависъвшихъ отъ временъ года, разныхъ перемънъ атмосферы, особенной мъстности, образа жизни и отъ другихъ вліяній, дъйствовавшихъ на здоровье людей.

Дивизія, въ 1835 и въ 1836 (до половины Апръля) год., расположена была, въ Царствъ Польскомъ, въ воеводствахъ: Плоцкомъ и Августовскомъ, изобилующихъ льсами, инзменными и
песчаными мъстами, гдъ, кромъ многихъ неболь-

шихъ речекъ, протекаютъ главныя реки: Наревъ, Бугъ, Висла, и находятся, особенно въ последнемъ Воеводстве, большія, каналами соединенныя, судоходныя озера, доставляющія тамошнимъ жителямъ большое количество рыбы. Въсихъ странахъ, на пространствъ около 300 верстъ, войска занимали квартиры по городамъ, мъстечкамъ и селеніямъ, гдъ, кромъ обыкновенныхъ своихъ занятій, исполняли еще гарнизонную службу, въ г. Варшавъ, Новогеоргіевской кръпости и въ другихъ мъстахъ.

Между бользнями, господствовавшими въ Дивизіи, первое мъсто занимаетъ повальное глазное воспаленіе, которое, еще въ 1834 году, первоначально возникло въ Витебскомъ Егерскомъ полку, находившемся тогда въ числъ войскъ, составлявшихъ гарнизонъ въ г. Варниявъ. Послъ того, при различныхъ условіяхъ, оно распространялось въ разной степени жестокости, продолжаясь, между нижними воинскими чинами, въ теченіе и 1836 года.

Глазная бользнь эта являлась вообще двоякимъ образомъ: а) въ видъ обыкновеннаго воспаленія (ophthalmia catharrhalis, rheumatica, scrophulosa), которое обнаруживалось зудомъ, краснотою соединительной плевы въкъ, незначи-

тельною мъстною болью, возвышенною чувствительностию глазь къ свъту и увеличеннымъ отделеніемъ слезъ; — сему воспаленію часто сопутствовали катарральные припадки: насморкъ кашель и проч.; b) въ видъ воспаленія гнойнаго (ophthalmia purulenta), обнаруживавшагося краснотою и припухлостью соединительной оболочки глаза, флегмопозною опухолью выкъ, особенно верхняго, чувствомъ тяжести въ верхней части глаза, постолиными болями въ надбровной сторонъ, распространяющимися часто по всей головъ, свътобоязнию, слезотсченіемъ, принимавщимъ бакое свойство и ота вленіемъ клейкой, желтовато-бълой влаги, имъвшей свойство заразительное (per contagium immediatum: потому что прислуживавшіе больнымъ, получали эту бользиь); притомъ на соединительной оболочкъ въкъ замъчалась зернистость, а иногда образовались на ней мясистые, неровные, наросты.

Къ развитію и повальности бользни этой немало способствовали: расположеніе, оставшееся посль неоднократнаго страданія ею, въ прошедшіе два года, труды при недостаткъ сна; вліяніе солнечнаго свъта, падающаго прямо на глаза, раздраженіе глазъ пылью, во время уче-

Digitized by Google

ній и земляныхъ работъ при кр. Брестъ-Литовской, простуда, особляво при работахъ, производившихся въ рвахъ, наполненныхъ водою, отъ чего люди подвергались продолжительному охлаждънію ногъ, тогда какъ тъло ихъ было разгорячено. Въ особенности же, развитію бользин этой способствовало: помъщеніе солдатъ въ казармахъ, гдъ, при многолюдствъ, возникала порча воздуха, не смотря на всъ старанія удалить ее. Равнымъ образомъ, при сборъ войскъ, глазное воспаленіе всегда распространялось и усиливалось въ тъсныхъ квартирахъ и лагеряхъ; а по возвращеніи войскъ на просторныя квартиры, оно примътно уменшалось.

Достойно также замъчанія, что глазная бользнь между высшимъ классомъ людей и между жителями почти вовсе не замъчалась. Слъдственно можно сомнъватся въ томъ, что причина этой эпидеміи зависьла отъ особеннаго состоянія атмосферы (Constitutio aëris epidemica): иначе и высшіе военные чины и жители, особливо рабочій классъ людей, находясь подъ вліяніемъ одной и той же атмосферы, неминуемо подвергались бы этой же бользии,

Леченіе глазнаго воспаленія располагалось по правиламъ, которыя изложены въ описаніи

глазной бользни, разосланномъ, при приказъ Господина Воевнаго Министра, отъ 12-го Ноября 1835 года No. 110, и въ практических в за-- мъчаніяхъ No. 11. Правила эти примъняемы были къ состоянио каждаго субъекта. Такъ: въ глазной бользии, появлявшейся, въ семъ году, но большой части, въ видъ обыкновеннаго простуднаго воспаленія, общія кровопусканія назначались ръдко; достаточны были одни только мъстныя кровопусканія, производимыя піявками, на виски и за уши, или банками, на затылокъ и между лопатокъ, приставляемыми.-infusum Внутрь назначались слабительныя: sennae salinum u pulvis submuriatis hydrargiri et jalappae Phar. castr.; равно также средства прохлаждающія: nitrum, cremor tartari и tartarus emeticus, въ малыхъ пріемахъ. Для наружнаго употребленія, кромъ того, назначались: частое промывание глазъ ръчною водою и слизистыми отварами, средства отвлекающія: нарывные пластыри, горчичники и раздражающія ванны, ножныя и ручныя.

Леченіе гнойнаго воспаленія, въ началь, состояло въ обильномъ общемъ кровопусканіи, повторяемомъ иногда нъсколько разъ, вмасть съ кровопусканіями мъстными. Внутрь предписывались выше упомянутыя средства, прохлаждающія и увеличивающія отдаленіе кишечнаго канала. Для промыванія глазъ употреблялись слизистые отвары, къ кониъ посль уменшенія воспалительнаго состоянія и при возвышенной чувствительности, прибавлялись наркотическія средства (tinctura opii crocata); на голову накладывались холодныя примочки; притомъ производились втиранія unguenti mercurialis grisei cum succo hyescyami, vel conii maculati, и unguenti stibiati, въ виски и за ущами.

При хроническомъ состояніи и золотушной сопряженности, внутрь даваемы были средства антимоніальныя; а снаружи назначались: нарывные пластыри, долгое время поддерживаемые, фонтанели, стягивающія глазныя примочки: collyrium superacetatis plumbi opiatum, collyrium zinci opiatum и collyrium cupri opiatum. Для уничтоженія зернистости требовались: прижиганіе синимъ купоросомъ и адскимъ камнемъ, или растворы сего же камня и ъдкой ртути; а при образовавшихся значительныхъ мясистыхъ наростахъ, иногда производимо было выръзываніе ихъ ножницами.

Къ обыкновеннымъ бользнямъ, господство-

Digitized by Google

вавшимъ въ разное время года, принадлежатъ слъдующія:

Въ Ноябръ мъсять 1835 года, при сырой и холодной погодъ, сопровождаемой, большею частію, западными вътрами, между воинскими чинами преимущественно господствовали: простудныя послабляющія горячки (Febres remittentes catarrhales); перемежающіяся же лихорадки, не смотря на осеннее время, появлялись ръдко. Глазное воспаленіе наиболье оказывалось тогда въ Могилевскомъ пъхотномъ полку, который находился въ Г. Варшавъ, и быль расположенъ въ казармахъ.

Съ наступленіемъ Декабря, начались сильные морозы; около 10-го числа, выпаль снъгъ, и съ тъмъ вместь открылась зима. Посль того, продолжалась необыкновенная въ той странъ, колодная погода, съ появлявшимися иногда жестокими выогами и морозами, доходившими до 25° по Р. Оттого многіе изъ нижнихъ чиновъ подвергались ознобленію разныхъ членовъ. Глазное воспаленіе, въ этомъ мъслиъ, по прибытіи Могилевскаго полка на квартиры, примътно уменщилось.

Въ Генваръ, 1836 года, погода была почти столь же холодная, и сопровождалась такими же морозами и вътрами, какъ и въ прежнемъ мъсяцъ. Посему и бользни, въ продолженіи этого времени, замъчались, большею частію, однородныя, простудныя послабляющія горячки, къ конмъчасто присоединялось мъстное пораженіе дыхательныхъ органовъ (Pneumonia и catarrhus pulmonum acutus). Ознобленіе членовъ встръчалось также и въ этомъ мъсяцъ.

Сообразно съ свойствомъ и сопряженіемъ бользней этихъ, способъ леченія ихъ быль преимущественно противувоспалительный, испражняющій и дъйствующій на испарину. При мъстномъ страданіи назначались слизистыя, маслено-слизистыя, успокоивающія и отвлекающія средства; а при ожесточеніи мъстнаго страданія, употреблялись мъстныя и общія кровопусканія.

Ознобленіе членовъ успашно излечивалось чрезъ постепенное развитіе теплоты въ отмороженной части; для сей цали, отмороженные члены были сперва оттираемы снагомъ, или погружаемы въ холодную воду, до тахъ поръ, нока обнаруживались въ нихъ признаки чувствительности и уменшались опухоль и боль. Посла того, для укрощенія въ обмороженной части воспалительнаго состоянія, употреблялись: solutio superacetatis plumbi simplex и composita, Phar. Castr., или деревяное масло, на
хлопчатой бумагъ прикладываемое. Послъднее
средство испытано мною, во время прошлой
зимы, въ лазаретъ Витебскаго Егерскаго полка
и въ другихъ случаяхъ, съ отличнымъ успъкомъ. При употребленіи этого средства, основывался я на превосходномъ дъйствіи его въ
ожогахъ. Въ сильнъйшей же степени озноблеція, когда оно переходило въ омертвъніе, назначались средства, употребляемыя при леченіи
антонова огня. При семъ, нъкоторымъ больнымъ произведено было отсъченіе ножныхъ
перстовъ, а одному отнята часть стопы.

Появившіяся оттепели, еще предъ наступленіемъ Февраля, смягчили суровость зимы. Но погода, въ продолженіе этого мъсяца и большей половины Марта, была самая непостоянная, сопровождавшаяся сильными вътрами, дождями и снъгомъ. При столь частыхъ перемънахъ атмосферы, обнаруживались, большею частію, ревматическія горячки, воспаленіе зъва и грудныхъ внутренностей. Глазная бользнь значительно усилилась въ Витебскомъ Егерскомъ полку, находившемся, вмъсто Могилевскаго, въ г. Варшавъ.

Подъ конецъ Марта, наступила теплая, весенная погода, вскрылись ръки, и въ началъ Апръля мъсяца, послъдовалъ большой разливъ воды. Съ открытіемъ весны, горячки приняли, большею частію, характеръ гастрическій; притомъ начали оказываться перемежающіяся, ежедневныя и трехдневныя, лихорадки, которыя впрочемъ не были упорны. Сообразно съ характеромъ бользней, при леченіи ихъ употреблялись пре-имущественно испражняющія и разводящія средства; а въ персмежающихся лихорадкахъ, кромъ этихъ средствъ, назначались и противулихорадочныя.

Находившійся въ г. Варшавъ, Витебскій Егерскій полкъ, въ первыхъ числахъ Апръля, прпбылъ на свои квартиры, въ г. Пултускъ, гдъ, по прибытіи сего полка, забольло воспаленіемъ глазъ болье 100 человъкъ. Труднъйшіе изъ этихъ больныхъ немедленно помъщены были въ отдъльномъ домъ, внъ города, а страдавшіе легкимъ воспаленіемъ глазнымъ (числомъ около 80 человъкъ) отправлены въ ближайшую къ полковому Штабу деревню, гдъ они, при чистомъ деревенскомъ воздухъ, удобномъ размъщеніи и при надлежащемъ присмотръ, почти безъ всякихъ врачебныхъ пособій весьма скоро нача-

ли поправляться, и многіе совершенно выздоровьли. Сею мърою, въ сказанномъ полку, число страдавшихъ воспаленіемъ глазъ, въ короткое время, значительно уменшилось.

При семъ нужнымъ считаю замътить, что, въ этомъ періодъ, у людей худосочныхъ и имъвшихъ расположеніе къ какимъ-либо хроническимъ недугамъ, первоначальныя бользни (morbi primarii, idiopathici) часто переходили во вторичныя (morbi secundarii) а именно: въ изнурительныя лихорадки, чахотки, водяныя бользни и т. п., по большей части, съ неблагопріятнымъ исходомъ.

Во второй половинь Апрыля, дивизія выступила изъ Царства Польскаго къ г. Брестъ-Литовску, куда прибыла 14-го Мая, для производства крыпостныхъ работъ. Полки расположились въ барракахъ, устроенныхъ на возвышенной, песчаной и почти со всъхъ сторонъ открытой, равнинъ, близъ ръки Буга.

Погода, въ Мав мъсяцъ, часто перемънялась; послъ теплыхъ, иногда жаркихъ и ясныхъ, дней наступали дни пасмурные, довольно холодные, съ ръзкими вътрами, дувщими наиболье съ съверовостока. Изъ бользней преимущественно оказывались послабляющия горячки и

перемежающіяся лихорадки, желудочнаго свойства; но число забольвшихъ, въ Дивизіп, вообще не было тогда значительное, въроятно потому, что, до прибытія въ Брестъ Его Свътлости Господина Главнокомандующаго дъйствующею армією, для торжественнаго заложенія, 1-го Іюня, оборонительныхъ казармъ, нижніе чины весьма мало еще занимались крыпостными работами.

Въ первой половинъ Іюня, наступившіе сильшье жары, заставляли опасаться, при начавшихся тогда ежедневныхъ работахъ кръпостныхъ, умноженія, между солдатами, бользней и ихъ злокачественности. Но скоро измънилось состояніе атмосферы. Со второй половины этого мъсяца, равно въ теченіи сльдующихъ, Іюля и Августа, погода продолжалась почти постоянно холодная, сырая, сопровождавшаяся бурными вътрами, проливными дождями съ громомъ, молніею и неоднократно падавшимъ градомъ.

Самое большое число больныхъ, бывшее въ Дивизіи 1836 года, представляетъ Іюнь мъсяцъ, въ которомъ преимущественно господствовали: послабляющія горячки и лихорадки простуднаго и желудочнаго свойства, не ръдко въ сопряженій съ воспаленіями грудныхъ внутренностей, также печени и кишечнаго канала. Въ особенности же, подвергались нижніе воинскіе чины глазному воспаленію; но Полоцкій Егерскій полкъ имелъ сравнительно гораздо меньшее число больныхъ глазами: потому что занимаемое имъ мъсто, было не столь песчаное и болье закрытое отъ вътровъ.

Простудныя горячки легко уничтожались употребленіемъ прохлаждающихъ средствъ, соединенныхъ съ сурьмяными; а желудочныя горячки прекращались, посль предварительнаго очищенія первыхъ путей слабительными, или рвотными, отъ употребленія Mixtur. muriatis ammoniae stibiatae и mixtur. acetatis potassae stibiatae, Phar. Castr. При сопряженіи ихъ съ мъстнымъ пораженіемъ внутренностей, грудныхъ и брюшныхъ, назначались, съ особеннымъ успъхомъ, общія и мьстныя кровопусканія, сладкая ртуть и слазистыя средства. Перемежающіяся лихорадки, посль испражняющаго и разрышающаго способовъ леченія, нерьдко требоваль хинныхъ препаратовъ.

Въ продолжение Іюля и Августа мъсяцевъ, бользии удерживали тоть же самый характеръ, и являлись подъ теми же формами, съ тою только разницею, что прибыль больныхъ вообще

была гораздо менье; въ особенности же уменшилось, въ Августъ мъсяцъ, число одержимыхъ глазною бользнію.

Въ началь Сентября, Дивизія начала выступать изъ г. Бресть-Литовска, на вновь назначенныя квартиры, въ Полтавскую Губернію, куда прибыла въ первыхъ числахъ Ноября мъсяца. Въ теченіе этого времени, при благопріятствовавшей погодъ, войска, находясь въ походъ, вообще имъли малое число больныхъ, одержимыхъ, большею частію, послабляющими, простудными и желудочными, горячками, равно воспаленіемъ глазъ, въ легкой степени появлявшимся.

Въ продолженіи 1836 года, было еще значительное число больныхъ венерическою бользнію, а также язвами разнаго рода. Для излеченія венерической бользни, съ первоначальными припадками, были употребляемы: calomel, mercurius solubilis Hahnemani и діэта противувоспалительная; а при вторичныхъ ея припадкахъ: —solutio и pilulae охутигіатіз hydrargyri, по способу, въ полевой Фармакопеи предписанному; равно также производились ртутныя втиранія. Въ самыхъ же упорныхъ случаяхъ, отличное дъйствіе оказывалъ Цитмановъ декоктъ. Къ развитно язвъ, оказывавшихся, большею частию, на спинъ и нижнихъ конечностяхъ, преимущественно способствовали: вереда воспалительнаго свойства, накожныя сыпи, и у многихъ, худосочіе, или особсиное бользисиное 
расположеніе (diathesis scrophulosa, scorbutica, 
аrthritica). Сообразно съ этими причинами, состояніемъ организма и страждущей части, леченіе язвъ производилось разными, какъ наружными, такъ и внутренними, средствами.

### III.

## НАБЛЮДЕНІЕ О ВОСПАЛЕНІИ ОКОЛОСЕРДЕЧНОЙ СУМКИ (PERICARDITIS).

Сообщ. Шпабъ-Докторомъ Гвардейскаго Корпуса, Ст. Совът. Нагулювитель.

Воспаленіе околосердечной сумки (Pericar-dium) относится къ воспаленію сердца точно такъ, какъ воспаленіе подреберной плевы (Pleura) къ воспаленію легкихъ; и какъ воспаленіе подреберной плевы соединяется съ поверхностнымъ воспаленіемъ части, а неръдко и всего существа, легкихъ: такъ точно и воспаленіе околосердечной сумки бываетъ вмъстъ съ поверхностнымъ воспаленіемъ мышечной части, всего существа и даже самыхъ полостей сердца; иногда же встръчается современное воспаленіе того и другаго органа.

Но сколь легко представить дъйствительную возможность такого воспаленія въ сопряжеиін: столь же трудно отличить оное, въ от-

двльности. Такъ, если больной получаетъ дрожь. за коею следують: жарь, жажда, рвота, боль и проч.; и если, сверхъ сего, предшествовала неумвренность въ пищь, или питьь: то бользнь такую обыкновенно приписывають погръшности въ діэтъ, и назначають рвотное лекарство, которое не доставляеть здась никакого облегченія, и всь припадки къ вечеру ожесточаются. Если же къ таковымъ припадприсоединяется кашель, тогда бользнь принимають за простудную лихорадку, почему и лечение назначають потогонное; если же, въ сльдующую ночь, больной чувствуеть себя еще , хуже, получаетъ чрезвычайную тоску и пр., то заключають, что простудная лихорадка сопряжена съ гастрицизмомъ. А если самый видъ больнаго, кашель, колотье въ груди, потеря силь и отдъление кровянистой мокроты, показывають другую важную бользнь, тогда подоэртвають присутствіе Peripneumoniæ biliosæ. Наконецъ, если и противъ этого недуга употребленное, дъятельное, лечение не оказало надлежащаго успъха: тогда уже, по внимательномъ, точный шемъ изслыдовании припадковъ, или по совъщании съ опытнъйшими Врачами, решительно заключають, что больной страдаеть воспаленіеми околосердечной сумки (Pericarditis). Но промедливь столько времени, не всегда можно уже, и при надмежащемь леченіи; ожидать успаха: потому что бользнь, либо переходить въ другія страданія околосердечной сумки и самаго сердца, либо же прекращаєть жизнь страждущаго.

Въ доказательство трудности распознаванія такого страданія, представляю слъдующій прииъръ воспаленія околосердечной сумки:

Медицинскаго Департамента Военнаго Министерства писарь Е. И., изъ военныхъ кантонистовъ, 19-ти лътъ, слабаго сложенія и значительно изнуренный, поступиль, 11-го Февраля сего года, въ военно-временный Госпиталь, учрежиенный въ домъ Купца Эгермана. Главнъйине принадки, у этого больнаго, были слъдующіе: жаръ всего тела, особенно головы, при вначительномъ охлаждении конечностей; сильная толовная боль, краснота глазъ, наполненныхъ слезами, безпрерывный шумъ въ ущахъ; ды--ханіе тоскливое, но съ удобнымъ вдыханіемъ, кашель легкій, но довольно частый, языкь бъловатый; пульсъ угнетенный, значительная боль предсердія, що причинь долго продолжавшейся частой рвоты, коею извергалась, больинно, частію, одна слизь, а иногда и желчь; брюхо опавшеє, и безъ всякой боли; испражневіся нивомъ: жидкоє, до трехъ разъ въ сутки: Но словамъ: больнаго, за тодъ предъ симъ, онъ, вы этомъ же Госинталь, цьявый мьсяць; съ твяъморъ, чувствує себя довольно здоровымъ, омъ: нерьдио, въ следствіе простуды, страдаль, сухимъ: наплемъ; но, въ продолженіи цьяко, года;, уже не получаль прежней, впрочемъ незначительной, полнеты твла. Наконець, за день: до вступленія въ Госпиталь, онъ получиль; сильный лихорадочный приступъ безъ явной-

Прощлогодняя исторія его бользни содержить описаніє желудочной горянки, принявшей, въ последствін, нервное свойство. По разсмотръвін принадковъ, и теперь бользнь представлят лась въ виль простудно-желудочной горячки, со-провождаеной сильнымъ, сочувственнымъ страданіемъ головы. Больному назначены: растительная діэта, кисловато-слизистое питье, стетог тальная діэта, кисловато-слизистое питье, стетог тальная діэта, кисловато-слизистое питье, стетог тальная діэта, кисловато-слизистомъ отваръ. Это было нечью, на 12-е число; а утромъ, последовало значительное облегченіе припадковъ, такъ што это же леченіе продолжаемо было и въ те-

чение цвлаго дня. Но вечеромъ, а особенно ночью, припадки весьма ожесточились; посему на следующее утро (15-го числа); въ то самое время, какъ я осматривалъ больныхъ Гвардейскаго Корпуса, Ординаторъ, видя сомнительное состояние этого больнаго, пригласиль меня на совъщание. Въ совекущности съ бывшими въ то время — Врачами Ординаторами, осмотривъ больнаго, заметили мы следующія, болезненныя явленія: біеніе сердца неправильное, дрожащее и какъ бы перемежающееся, сопровождаемов шумомъ, подобнымъ кипящей жидкости, и весьма непріятнымъ чувствомъ для больнаго (это очевидно указывало не на простудную желудочную лихорадку); --- далье, жарь и тупую больвъпредсердін, съ чувствомъ тяжести около сердца, чрезвычайную тоску и безпокойство, кашель ночти безъ мокроты, прерывистый, ожесточающийся отъ прижатія надбрюшной стороны, дыханіе короткое, трудное, со вздохами, но при полной возможности глубокаго вдыханія, не прерываемое ни болями въ груди, ни каплемъ; положение больнаго удобное на спинь, безпокойное на львомъ боку, но безъ особенняго колотья, свойственнаго воспалению подреберной плевы; глаза къ свъту чувствительные, бльдность и измъненныя

черты лица, опавшаго и какъ бы въ длину, вычинутаго. Наконецъ какъ всь сіи мъстные признаки сопровождались жестокою воспалительною горячкою, съ пульсомъ угнетеннымъ, поперемънно скорымъ и медленнымъ; то мы божвань Ег. Ив. единогласно признали воспаленіемъ околосердечной сумки (Pericarditis).

Не смотря наполабость и изнурение больнаго. кровонускаціе, до фунта, сдалано изъ львой руки; притомъ назначены: пріемъ двухъ гранъ сладкой: ртути: съ сахаромъ, чрезъ каждые два чеа, слизистое питье и четверть Госпитальной растительной порціи. Вечеромъ и ночью, больной бредиль; къ утру же (14-го числа), приливъ крови къ головъ уменшился, по тълу жачали показываться бледнокрасныя пятнымики; поверхность выпущенной крови была покрыта твердою, воспалательною плевою. Леченіе, сего числа, оставалось то же; но, посль полудия, нри ожесточени горячки, назначено : выше упомянутые порошки, съ прибавлениемъ полуграна наперсточной травы, давать чрезъ три часа; при появлени бреда приставлены были къ икрамъ горчичники.

Посль такого ожесточения горячки съ прежнинъ послаблениемъ, 15-го Февраля предписано:

-infusum digita parpura (полудрахмы траны на -шесть унцій жидкости) даватвопрезтокаждий мося; поперсменно се однограниеми порошими сирдкой ртути. Цвль сего предпиский была чя; чтобы усилить альйствіє наперсточной травы на -крачопосную и всасывающую, системы Канполуночи, при ожесточени принадковъ, послидон вилъ сильный бредъ, плаза налимись кревію, пойему: тотчасъ поставлено за ущи 42 піявокъ, и кровотечение поддерживалось до возможности; ки, учру, больной гуспокоплен, издаже, спальда: по Девраля 16-го, одногранные порощки сладкой ртути и наливка наперсточной травы, также попеременно были продолжаемы, но презъ два 48484 t To the transfer of the common than the action. 17-го, пульсь развить, гораздолбор по Февраля инеста. правой, нежели на лькой, рукь; вск припадки, въ жестокости своей, значительно Уменицились; притомъ появилось припухаще досень; сладкая ртуть оставлена, наперсточная же страва была продолжаема; спустя одинь жень, исона оставлена, чет до до н ... Февраля 20-го,. біеніе сердца почти правильное. Для подкрыпленія дыятельности организма и вспомоществованія всасыванію начавщарося уже, можеть, быть, вынотанія, сывороточной

жидкости. въ: околосердечную сумку, предшист но: infusum: Aer. arnicae (изъ дракны дветовъ ная шесть унцій жидкости) і даваты, с чрезъ і два часа; по двъ столовыя ложки. Запоры на: низъц съ 16-го числа сопровождавшів бользинавтур преодолъваемы были приличными средствами. п -: Февраля: 25-го, припадки горинки на чали міло по соману печезать; в носспульсь сещения теперь бымь: значительные развиты, на правой, нежели на лъвой, рукв. Bidh, "co. ..0.. Февраля 25-го, при употреблений сказаниего лекарства: эк пириличных в прісмахъ, больной началь видимо моправлятын; пульсы въ обыч ная рукахъ уравняясн у біенія сердца были уже столность в рассии в применения в принципаний в в принципаний в принципа Ф. 27-го, мекарства оставлены; больной при падлежащемь содержаніи ні примичной, прохлас дительной діэть, совершенно выводоровных. «Почи Многократныя наблюденія удостоварили меня въ томъ, что бейвани оконосердечной сумки и самаго сердца, между военно-служащими, осо одекот потоменства, писничними соптом чаще, инежели икакъ импиноматиемъм Кръжков тълосложение (нижнихъ! воинскихъ чиновъ, частое) и быстров папряжение ихв груди, усиленнов тьлодвижение, притомъ хотя медленное, но

ночти постоянное, дъйствіе визминих причина на грудные органы, преимущественно располагають въ этимъ бользнямъ, которыя однакожъ неръдко принимаются за другія, болье обыкновенныя, бользни грудныя, особенно же за воспаленіе льваго легкаго.

«Посему не излишнимъ считаю упомянуть о различи припадковъ воспаленія околосердечной сумки и сердца отъ припадковъ воспаленія легкихъ.

Кашель, при воспаленіи околосердечной сумки, либо вовсе не оказывается, либо же бываетъ сухой, короткій и усиливающійся отъ прижатія надбрюшной сторожы; при воспаленій же легкихъ, кашель принадлежитъ къ постояннымъ припадкамъ и долго продолжается.

Мокрота (sputum), въ первомъ случав, извергается безъ явнаго облегченія, а въ послюднемъ, замьтно облегчаетъ.

Вдыханіе, въ обоикъ случаякъ прудное, сопровождается, при воспаленіи околосердечной сунки, вздохами.

Вдыжание заубокое, при воспалении околосердечной сумки, возможно; оно не прерывается пи болями въ груди, ни капілемъ, и даже насколько облегчаетъ; при воспаленіи же легкихъ, глубокое вдыханіе едва возможно, притомъ сопряжено съ болью.

Положение больного: при воспалении околосердечной сумки, больной обыкновенно можеть, свободно лежать на спинь (чемъ воспаление это наиболье отличается отъ воспаления льваго легкаго и подреберной плевы); если же, при воспалении околосердечной сумки, больной не можетъ свободно лежать на спинъ, то это происходить отъ тоски и безпокойства; напротивъ того, при воспалении льваго легкаго и подреберной плевы, невозможность лежания на симнъ зависить отъ каниля и колотья.

Тоска и дрожение сердци; вилиются, въ первоми случав, почти при самомъ началь бользии, а во оторомь, при дальнъйшемъ продолжении ся.

Реота, при воспаленіи околосердечной сумки, происходить не оть кашля; при воспаленій же легкихъ, рвота возбуждается презъ каписль.

ें ए ec. ए साहर और १९५० में अध्यक्षक, मनुमद्दरुक्षक रवामृत-प्रत्यक्ष एक रें साम्यः

Пол жене волькой куп восимения околосердено от самы, быласы обыкновения можеть

етс віноськи ва струм (чля вистемни вістемни віс number 2 . Turantered orb Bocheachin Aubiro Jer-О ПРОИЗВОДСТВЪ ОПЕРАЦИИ КАМНЕКРУШЕНЦЯ. (LITHOTRITIA) V APADOBE, BE XII H XIII BEKAXE. -outs et a et (Revue medicale, Juillet, 1837). исходин почетой оченей и информации и истромина чень, вре осочествей доваго межате и годреатВът Хронической паблиць Исторіи канцекрушенія (Lithotripsia) Leroy d'Etiolle приводить выниску лизъ совинения знаменитако Арабскато Врача ... Аззапаний управрстнато праводне подв. именень : Ажбуказиса и умерингоня Кураува, възд 1072 Выписка, ота, павленениза нав кирти ero: Liber theoriess, nec non practices, Ackashir ваетъм мтол опъсривав понявіе сопроизводству. Lithotripsiae, ибо онъ говоритъ: «Accipiatur «instrumentum subtile, quod nominant masha-«farebilia, et suaviter intromittatur in virgam; «nunc volve lapidem in medio vesicae, et si «fuerit mollis, frangitur.» Однакожъ онъ не излагаетъ подробно способа производства операціи, и ничемъ не доказываеть, чтобъ дълаль

оную самъ, илипвидълъ, какът двлали другие Ученый сотествоиспытатель «Clément - Mullet, извъстный переводомъ сочинения Линка .: Histoire de l'Antiquité éclairée par l'histoire maturelle; открыль вы одной Арабской кишть, переводомъ коей онъ теперь занимается, явныя доказательства, что первые опыты Литогринсін падъ человъкомъ производильсь уже весьма давно. Книга эта импеть название: La Fleur des pensées sur pierres précieuses, par Chehab - Eddin - Ahmed - Ben - Joussoufr Teifascky. Вотъ извлечение изъ оной: «отификная польза алмаза, о коей говорить Ари-«стотель, и :которая подтверждается опытомъ, «есть употребление его въ каменной бользни; «если больной имъетъ камень, или въ мочевомъ «пузыръ, или въ мочеиспускательномъ каналъ, то «берется небольшой кусочикъ алмаза, и приакрыпляется къ концу металлического прута, адълаемаго изъ серебра или мъди, который «вводится въ ту часть тьла, гдв находится «камень, дабы раскрошить оный чрезъ часто, чо-«вторяемое треніе. Ahmed-ben-Abikheld, Врачь, «извъстный подъ именемъ Евп-Al-Harra, въ своей о камняхъ, пишетъ, что онъ «употребиль сей способъ операціи надъ слугою

«Евнуха — Зонтиконосца, который имвль боль-«той мочевой намень; больной этоть, во его «увтренію, никакь не хотвль подвергнуться «операціи намнественія; и онь, употребивь выше-«сказанный методь, разрушиль клмень помощію «тренія; и довель его до столь малаго объема, «что онь могь вытти вместь съ мочею.»

Вышеприведениая выписка изъ Арабскаго сочинения уничтожаеть всякое сомнине о производствъ сей операціи. Итакъ Литогритія, чрезъ треніе производимая, эта операція, — кося самый древній опыть, сдъланный надъ Маіоромъ Мартенеми, изложень въ Марсетовомо сочинении: on Calculous disorders, — была совершена назадъ тому нъсколько стольтій. И действительно, Арабскій Врачь Teifaschy, получившій названіе оть Аравійскаго города Тейфа, писаль объ ней въ 640 году, послъ бъгства Мухаммеддова изъ Мекки въ Медину, что соотвътствуетъ нашему 1242 году по Р. Х. При чемъ замътять надобно, что онъ упоминаетъ объ авторъ, писавшемъ о семъ предметь прежде его, что и заставляеть отнести начало Литотритіи къ началу XIII BEKA.

Хирургія *Альбуказиса*, изъ коей ны привели уже одно мъсто, содержить въ себъ также свидение о разрушения камия въ мочевомъ канале, которое заслуживаетъ темъ болъе внимація,
что по оному можно определить время начатія
сей операціи. Ибо действительно извъстно, что
Альбуназись жилъ, въ Кордув, въ конце XI
въка; и хотя его способъ производства операція
касается только мочевыхъ камней, содержащихся въ мочевомъ каналь: но, при всемъ томъ, онъ
долженъ быть считаемъ первымъ началомъ
Литотритіи. Мъсто это находится въ Латинскомъ переводъ Дж. Ченнинга. изданномъ въ
Оксфорть, 1778 года, въ Томъ 1, на стр.
289. Вотъ собственныя слова его.

«Ежели камень не имъетъ большой величины и «содержится въ мочевомъ каналь, препятствуя «испущенію мочи: то, не приступая къ камнесъче-«нію (Lithotomia), должно употребить показан-«ный нами способъ, который часто избавляетъ «больнаго отъ камнесъченія, я сопровождается «счастливымъ успъхомъ. Онъ состоитъ въ слв-«дующемъ: берутъ инструментъ для сверленія, «имъющій фигуру V, и приготовленный изъ Дама-«ской стали; онъ долженъ быть треугольный, «весьма острый, и снабженный деревянною руко-«яткою. Потомъ, помощію нитки, дълаютъ пере-«вязку выше камня, дабы онъ не ускользнулъ въ «ся выструменть вы мочевой каналь, до сама-«ся выструменть вы мочевой каналь, до сама-«то камия. Чревь приведение инструмента въ «кругообразное движение, камень мало по малу апросверливается, до тъжь поръ, нока онъ не «получить скважины. Тогда тотнасъ выжекаетъ «моча, и Операторъ номогаетъ руками выхо-«жденио остатковъ камия, который бываетъ «тогда уже раздробленъ, и выходить вмъсть «съ мочею, а страждущий органъ получаетъ «значительное облегчение, по воль Божіей.»

Неннинга, въ переводъ своемъ, для сообщенія понятія объ очертаній этого инструмента, ссылается на страницу 157, гдъ изображенъ ножъ, подобный Рихтерову ножу для бъльна. Бывъ увъренъ, что тутъ вкрадась какая инбудь ошибка, я просилъ Г. Клеманъ-Мюллета справиться о томъ въ Арабской рукописи, хранящейся въ Королевской Библіотекъ. И дъйствительно оказалась, что очертаніе инструмента, въ сказанной рукописи изображеннаго, вовсе не сходствовало съ очертаніемъ его, представленнымъ въ переводъ Ченнинга: этотъ инструментъ имълъ видъ жельзнаго пила, укрыпленнаго въ деревяной рукояткъ.

Другое, весьма любопытное мъсто, касательно сего предмета, находится въ сочинении *Moha-*

точнымъ Плиніємъ. Въ этомъ сочиненіи, подъ нажиніємъ: Livre des merveilles de la mature et des choses créés сказано: «Ученый Аристопель говоритъ, что Александръ «зналъ свойство камней. Ко мнъ привели чело-«въка, страдавшаго камнемъ въ мочевомъ кана-«лъ; помощію мастики, я прикрыпилъ его «(подразумъвать надобно алмазъ) къ металличе-«скому пруту, ввелъ въ каналъ, и чрезъ растира-«піс разрушилъ камень, помощію Божією.»

Мъсто это весьма темно; Clément Mullet не могъ даже отискать его въ рукописяхъ Kasswini. Ссылка на Аристотеля не имъетъ также достовърности: ибо мы не знаемъ ни одного сочиненія его о камняхъ; и Kasswini говоритъ объ немъ, или на удачу, или основываясь на какомъ нибудъ подложномъ сочиненіи. Трудно также опредълить, разумъется ли здъсь, подъ именемъ Александра, побъдитель Дарія; но, при всемъ томъ, мъсто это важно для насъ, какъ доказательство, что Kasswini зналъ уже способъ производства операціи, упоминаемой Teifachy.

Изъ всъхъ, вышеприведенныхъ, ссылокъ заключить слъдуетъ, что между Арабами съ XI въка было извъстно камнекрушеніе (Lithotritia),

хотя не столь усовершенствованное, какъ нынашнее, начало коего, безъ сомнанія, надобно считать со времени изобратенія трехзвенныхъ щипцовъ (ріпсе à trois branches) Г. Лероа д'Этіоля, усовершенствованныхъ какъ самимъ изобратателемъ, такъ и Гг. Якобсономъ, Сивіалемъ, Гертелу и Ремюза. Въ заключеніе сказать можно, что хотя операція эта досель еще остается въ младенчествъ, но она не составляеть уже одного только предмета теоретическихъ взглядовъ: потому что, со времени введенія ея, многіе изъ страдавшихъ камнями подвергались ей, и дъло оканчивалось счастливымъ успъхомъ.

#### V

#### О МАЛИКЪ, ЭПИЗООТИЧЕСКОЙ БОЛЬЗНИ РОГА-ТАГО СКОТА.

Извлечение изъ паблюдений *И. Флерова*, Ветеринарнаго Лекаря перваго полка Астраханскаго Козячьяго войска.

(Сообщиль Профессорь В. Всеголодов).

Малика есть слово Калмыщкое, и представляеть, по наблюденіямь Г. Олерова, злую, или гнилую горячку (Febris maligna, typhus putridus-epizooticus), которая поражаеть рогатый скоть не разсьянно, но переходя изъ мъста въ мъсто постепенно. Такъ, зародившись въ одномъ, какомъ-либо, округъ, она, на извъстномъ пространствъ, совершаетъ лихорадочное теченіе свое, до окончанія свойственными горячкамъ исходами, а потомъ уже переходитъ въ следующій, сосъдственный, округъ, и здъсь такимъ же образомъ развивается, но далье (въ стороны) не распространлется, до совершеннаго

окончанія своего; посль того, она опять переходить въ другое мьсто. Это есть характеръ распространенія Малика.

Въ такомъ видъ, бользнь эту Г. Олеровъ наблюдалъ, 1833 года, на пространствъ отъ г. Серпухова до границъ Астраханской Губерніи, гдъ, въ то время, еще все было благополучно. Но когда, по случаю неурожая, жители Малороссіи начали, на зиму, перегонять рогатый скотъ на дальнъйшія степи: то немедленно появился и Маликъ, который однакожъ, съ наступленіемъ весны 1834 года, при изобиліи хорошаго корма, совершенно прекратился здъсь.

Въ такомъ же видъ, и въ такой же силъ, Маликъ, по наблюденіямъ Г. Олерова, оказался 1835 года, на Кавказской линіи, по теченію ръкъ Терека и Малки. Здъсь жестокость бользна была столь сильная, что изъ заболъвавшихъ животныхъ умирало болье половины.

Въ теченіи Малика Г. Олеровь различаеть три періода: предзнаменовательный, воспалительный и гнилостный.

Въ первомъ періодъ, скотина сперва задумывается, отстаетъ отъ своего гурта, или стада, теряетъ позывъ на кормъ, не отрыгаетъ жвачки, имъетъ голову поникшую, ущи обвислыя, не поглощаетъ слины, по виду и кансству, здоровой; дыханіе бываетъ медленное и слабое; во всъхъ движеніяхъ явственно примътна слабость и вядость.

Въ періодъ воспалительномъ, всь эти признаки ясные обнаруживаются, и принадки болье Упадокъ силь бываеть весьма ожесточаются. значительный, такъ что скотина принуждена болге лежать, либо же стоить, какъ бы въ оприснения, не одноме месте, при чеме дыханіе имьеть весьма частое, короткое, но сильное и двойное (respiratio duplicata). Глаза бывають красные, слезящеся, неподвижно устремленные на одинъ какой-либо предметь; изъполости рта и носа течетъ слина и слизь, въ большомъ количествъ, но още безъ всякаго запака. Языкъ бълый, но не истрескавшійся; десны и нёбо, красныя. Животное оказываеть сильнейшую жажду; рога и уни, бывають горячіс. Словомь, животное находится въ горячка. — Въ этомъ періодъ, появляется уже понось, простый, или кровавый, или, вмъсто того, бываеть запоръ, либо обнаруживается скопление вътровъ.

Въ третьемя неріодъ, животное безпрерывно лежить на земль, оъ поджатыми могами, съ поникщею головою, съ закрытыми и гноящимися глазами. Дыханіе бываеть тяжелое, прерывистое, со стономъ и съ выдыханіемъ смраднаго воздуха. Слина отделяется въ большомъ количествь, и вытекаеть изъ рта, въ видъ клейкой, тягучей слизи, и также издаетъ непріятный запахъ; равнымъ образомъ, изъ ноздрей вытекаетъ густая, часто съ кровью смышанная, мокрота. Кожа съ языка сходить значительными клочками. Моча испражилется вонючая; испражненія низомъ, при поносъ, бываютъ смрадныя, вонючія, цвъта черноватаго или желтаго, но всегда слизистыя; при запоръ оказывается раздутость брюха, облегчаемая выхожденіемъ вътровъ. Въ этомъ положеніи, явственно доказывающемъ изнеможенное состояніе всего пищеваго канала, животное, большею частью, издыхаеть.

Предъ наступленіемъ смерти, хищныя птицы слетаются къ животному, выклевывають у него глаза и прочія доступныя части.

Главнъйшія явленія, при трупоразъятіи замъченныя, были сльдующія: мясистыя части оказались гораздо краснье, нежели у здоровой скотины, особливо около позвоночнаго столба. Кровь имьла весьма темный цвътъ, свойственный дегтю. Въ мозгъ найденъ только приливъ темнокра-

сной крови. Легкія, снаружи и внутри, имбли цвътъ желтоватый, сложение вялое, и при разрьзь источали отчасти пънистую кровь, большею же частио, пънистую слизь. Носовая полость и дыхательное горло наполнены пънистою мокротою, смъщанною съ кровью, и въ большомъ количествъ скопившеюся около надгортаннаго отверстія. Въ сердць, оба желудочка и оба предсердін наполнены черною, ссъвшеюся кровію. Въ полости рта, лесны, нёбо и подъязычье, равно какъ и на языкъ, кожица, покрывающая общую перепонку рта, оказались въ надлежащемъ состояній; но кожица, послъ заворота своего чрезъ края губъ рта, въ нъкоторыхъ мъстахъ отстала отъ лежащей подъ нею мокротной, или сосудистой перепонки. Внутренняя поверхность пищепріемнаго горла была краснье обыкновеннаго. Въ первыхъ трехъ отдъленіяхъ желудка, составляющихъ входную долю его (portio cardiaca), кромь густой пищевой смвси, болье пичего не замъчено. Въ тонкихъ кишкахъ нъкоторыхъ животныхъ видны были слъды Всего чаще это встрвчалось въ омертвънія. двенадиатиперстной кишкъ. Толстыя кишки, у животныхъ, страдавшихъ поносомъ, были краснъе, нежели какъ въ обыкновенномъ состояни.

Печень весьма большая, и какъ бы вздутая, имъла, снаружи и внутри, цвътъ темнье объщновеннаго, и казалась какъ бы сваренною, по причинъ скопленія черной, спекщейся, крови въ волосныхъ сосудцахъ ея. Желчный пузырь весьма разстянуть скопившеюся желчью темнаго, а иногда желтаго или желто-зеленаго, цвъта, Калмыки увъряли Г. Флерова, что иногда бываеть даже разрывь желчнаго пузыря. Селезенка, подобно печени, имъла, снаружи и внутри; цвать темные обывновеннаго, притомъ казалась размягченною, и при разръзъ источала пънистую кровь. Почки и мочевой пузырь, не были изменены; но содержавщаяся въ последнемъ моча имъла чрезвынайно смрадный запахъ.

Посль сего Г. Ф. издагаеть ниже слъдующих различіп между и Маликом в за собственно такъ назыв. Чумою рогатато скота:

- 1.) Чума, между рогатымъ скотомъ, развивается ніе заразы, и переходить оть одного животнаго на другое, по одиначкъ, особенно въ
- 1.) Маликъ, и въ сажемъ началь своемъ. чрезъ непо- обнаруживается вдругъ средственное сообще- на многихъ животныхъ, въ одномъ округъ ходящихся, безъ всякаго, видимаго, сообщенія заразы, такъ что жи-

началь своего появленія.

- 2.) Чума распространяется непременно на всехъ животныхъ, находящихся въ непосредственномъ, или посредственномъ сообщеніи съ заразою.
- 3.) Чахотный кашель, накожныя сыпи и злокачественные нарывы въ пахахъ и на бедрахъ, составляютъ какъ бы отличительное произведение чумной заразы.
- 4.) Чума, въ теченіи своемъ, гораздо бысстрье; ръдко случается, чтобы зачумленное жи-

- вотныя, расположенныя къ воспріятію этой Эпизоотіи, поражаются какъ бы угаромъ, коего причина однакожъ находится виъ круга ихъ.
- 2.) Маликъ дъйствуетъ только на предрасположенные субъекты; и многія животныя, находившіяся подъ вліяніемъ этой Эпизоотіи, оставались здоровыми.
  - 3.) В маликъ такія произведенія бользненныя никогда не оказываются.

4.) Маликомъ пораженное животное можетъ прожить до трехъ недъль. вотное прожило болье

- **5.)**: Мясо **ТХІННУР** блвдиве животныхъ обыкновеннаго; кровь бываетъ свътлокрасная и въ маломъ количествъ; третій желудокъ растянутъ, и ощупываніи снаружи твердъ, какъ камень; по вскрытіи его, между листами всегда находится кормъ сухой, и твердый, какъ будто въ печи засушенный, такъ что съ нимъ вмъсть отдирается и самая внутренняя кожица желудка.
- 5.) При Маликъ, напротивъ, мясо бываетъ
  краснъе обыкновеннаго;
  кровь темная, смолистая,
  какъ деготъ; а въ третъемъ желудкъ Г. Ф. никогда не находилъ сказанныхъ неремънъ.

Предсказаніе при Маликь, большею частію, бываеть неблагопріятное. Однакожь, можно надъяться на выздоровленіе тогда, если скотина, при кръпкомъ тълосложеніи, не вмьеть большой тучности и явственнаго полнокровія; если при понось, даже и чрезмърномъ, извергаются

не вонючія испражненія. Напротивъ того, если къ поносу съ вонючими, желто-слизистыми испражненіями присоединяется и зловонное выдытаніе; или если посль поноса вдругъ сльдуетъ заноръ, и присоединяется сильное раздутіе живота (meteorismus): тогда смерть непэбъжна. Стельныя коровы обыкновенно получали выкидышь, если беременность ихъ еще далека была отъ разръшенія; если же плодъ былъ зрълый, то онъ раждался живымъ, но уже больнымъ, и вскоръ издыхалъ вмьсть съ матерыю.

При легеніи Малика, особенное вниманіе заслуживають сльдующія правила:

- 1.) замытивь, вы стадь или гурть, скотинь, начинающихь задумываться, отставать оть стада и т. п., немедленно нужно отделить ихъ въ особливый сарай, или, если это случилось въ степи, въ лабазъ, могущій защищать ихъ отъ дъйствія внышнихъ вліяній вредныхъ.
- 2.) Доставивъ надлежащую защиту отъ непогодъ, никакъ не должно дозволять животныхъ поить холодною водою, а особливо до пресыщенія. Г. Ф. опытами доказываетъ, что въ
  каждомъ случат, когда животныя утоляли
  жажду свою снъгомъ, или холодною водою,
  развивалось у нихъ сильное воспаленіе желудка

Digitized by Google

и кищекъ, къ коему вскоръ присоединялся кровавый поносъ, неизивнио оканчивавшійся смертью.

3.) Вмъсто этого вреднаго пойла, надобно больной скотинъ давать овсяную, или отрубную болтушку теплую (растворъ означенныхъ веществъ въ теплой водъ), а по временамъ, постное масло, т. е. лъняное, или конопляное, всегда чистое и свъжее.

Далье, Г. О. между прочимъ упоминаетъ объ употреблении камфоры съ сърою, и наконецъ замъчаетъ: а) что водку съ перцемъ, или кучелябой (пих vomica), употребляли скотоводы, но всегда со вредомъ; b) что кровопускание полезно только въ первомъ, или въ началъ вторато періода бользни; с) что лучшее предохранительное средство противъ этой бользни есть поваренняя соль, которую надобно ежедневно давать скотитъ, въ небольшихъ количествахъ, съ кормомъ, или пойломъ.

# VI.

О БЛАГОТВОРНОМЪ ДЪЙСТВІИ СОЛЯНОКИСЛАГО ЗОЛОТА (MURIAS AURI, AURUM MURIATICUM) ВЪ ЗАСТАРЪЛЫХЪ И УПОРНЫХЪ, ВЕНЕРИЧЕСКИХЪ ЯЗВАХЪ.

Наблюденіе Л.-Гв. Московскаго полка Полковаго Штабъ-Лекаря, Медико-Хирурга, Надв. Сов. Соколова.

Судя по необычайному множеству книгъ и трактатовъ, около четырехъ въковъ постоянно посвящаемыхъ описанію, изслъдованію и леченію венерической бользни, казалось бы, — все уже придумано къ коренному врачеванію этого зла; но ни въковые опыты Врачей, ни разнообразіе средствъ, не могли до сихъ поръ доказать, что этотъ грозный недугъ, подъ вліяніемъ съвернато климата, во всъхъ случаяхъ исцъляется върно, безопасно, безъ непріятныхъ слъдствій. Это обстоятельство зависить: а) отъ совокупности венерической бользни съ худосочіями: золотушнымъ, лищайнымъ, цынготнымъ; б) отъ не-

осторожнаго употребленія ртутных средствъ, особливо въ Госпиталяхъ, гдъ больные этого рода подвергаются простудъ, отъ чего ртуть неръдко оказываетъ на организмъ дъйствіе болье разрушительное, нежели самая зараза любострастная.

Слъдственно, какъ бы великъ ни былъ запасъ противувенерическихъ лекарствъ, все еще остается обширное поле, для наблюдательныхъ Врачей, изслъдывать новыя средства у кровати больныхъ, и результаты счастливыхъ опытовъ передавать, для блага страждущаго человъчества.

Новъйшая Химія, между многими удачными соединеніями соляныхъ основаній съ кислотами, умножила область Фармакологіи превосходнымъ средствомъ для исцъленія застарълыхъ припадковъ венерической бользни. Я здъсь разумью солянокислое золото (Aurum muriaticum, s. Chloruretum auri, s. Murias auri.) Не исчисляя всъхъ опытовъ заграничныхъ Врачей надъ этимъ препаратомъ, я представляю собственное мое наблюденіе, гдъ Aurum muriaticum оказало благотворное дъйствіе, тогда какъ ртутныя средства, при дальнъйшемъ ихъ употребленіи, не смотря на смътливость и осторожность врачующаго, могли бы разрушить больнаго.

. Digitized by Google

24-го Апрвая прошлаго 1836 года, поступиль во ввъренное мнъ отдъление Лазарета Лейбъ-Гвардін Семеновскаго полка Унтеръ-Офицеръ Л.-Гв. Литовскаго полка Г. С., 40-лътній мужчина, крыпкаго тылосложенія, не испытавшій прежде сего никакихъ важныхъ бользней, съ запущенною, глубокою, нечистою, мозолистыми краями ограниченною чувствительною и общирною язвою (Ulcus), которая занимала почти всю поверхность головки penis; притомъ онъ имълъ по всему телу, съ головы до ногъ, сыпь, въ видъ влажныхъ, бородавчатыхъ наростовъ, кои массами обезображивали его лобъ, въки, носъ, подбородокъ, плечи, а наиболье лядвен и scrotum. Язва открылась на двтородныхъ частяхъ post coitum impurum. Общее состояніе здоровья  $\Gamma$ .  $\cdot$  C. было не худое.

Принявъ бользнь за Syphilis inveterata, и на 25-е Апръля, очистивъ первые пути, мы приступили къ внутреннему употребленно сулемы въ растворъ; а наружныя язвы и скученные наросты приказали перевязывать Aqua phagadenica nigra, назначивъ приличное, дістическое содержаніе.

До 7-го Мая, не заметно никакой существенной перемены въ состояни бользии Мая

Digitized by Google

13-то, не смотря на правильное отправление первыхъ путей и строгое дістетическое содержаніе, употребленіе сулемы оставлено: потому что десны припухли и больли, а слинотеченіе было обильное. Назначены: приличное полосканье, а для питья древесный отваръ (D-tum Lignorum). Больной принялъ, во все это время, 41/8 грана сулемы.

Съ 16-го Мая, когда чувствительность десень уменшилась, а наружныя язвы приняли не пріятный видь, источая смрадную, жидкую, полусу-кровичную влагу, мы помъстили больнаго въ особую, чистую комнату, и предписали ему, для внутренняго употребленія, селитряную кислоту (3 ј на фунтъ Infusi rad. Acori calami), имвя въ виду этими средствами предотвратить развитіе цынготнаго состоянія.

До 24-го Іюня, не было никакого улучшенія въ наружномъ состояніи наростовь; а между тымь обнаружились ночныя, костныя боли въ обыхъ конечностяхъ. Бородавки, на лиць и лядвеяхъ, превращались мало по малу въ разъъдающія язвы, больли, источая, по прежнему, полусукровичную влагу. Назначено: Acidum пітгісит продолжать, а язвы омывать и перевязывать отваромъ маковыхъ головокъ (D-tum сарітит рарачегія). Въ это время, больной

худьять, теряя позывъ къ пищь и страдая полубезсонницею.

Въ половинъ Іюля, видъ больнаго былъ страшенъ, потому что язвы въкъ и носовыхъ крылъ (Alae nasi) приняли форму влажныхъ, грибовидныхъ наростовъ; а между тъмъ душевная тоска и ночныя боли приводили его въ отчание. Въ этомъ состояни, не смотря на постоянное употребление приличныхъ средствъ, больной, по видимому, то поправлялся, то снова впадаль въ безотрадное уныніе, по причинъ ожесточающагося зла, которое начинало уже поражать и носовые хрящи, и внутрениюю полость зъва, и систему жельзъ, судя по обнаружившемуся отвердьнію льваго личка. Септября 3-го числа, прописанъ былъ Цптмановъ кровочистительный декокть (D-tum Zittmani), со всьми діетическими предосторожностями.

Въ продолжение Сентября, Октября и Ноября, больной приняль 70 фунтовъ этого декокта No 1 и 2-го; положение его нъсколько улучшалось, т. е. живы не больли, отдъляемая ими влага была не такъ смрадна, а поверхность ихъчище; но бородавчатые наросты на лиць и ушахъ нимало не измънились; а ночныя боли конечностей хотя и умениились, но еще были

мучительны. И потому то; 3-го Декабря, Штабъ-Докторъ отдельнаго Гвардейскаго Корпуса, Г-нъ Статскій Советникъ Нагумовичь, коему я много обязанъ за отличные Клиническіе совъты, посътивъ заведываемое мною Госпитальное отделеніе, изволилъ предложить, для внутренняго употребленія этому больному, не подававшему, по видимому, никакой надежды къ выздоровленію, солянокислое золото, вместъ съ отваромъ изъ корня гад. smil. sarsaparillæ: потому что ни количество употребленной сулемы, ни методическіе пріемы Цитманова декокта, не могли остановить развивавшагося зла, и нимало не соответствовали нашимъ ожиданіямъ.

Rp. Auri muriatici grjj Resinæ guajaci 3j.

Sachari albi 36. M. fiat pulvis, dividendus in partes aequales XVI. S. Bis pulv. j quotidie sumat in decoeto Sarsaparillæ.

Первое дъйствіе солянокислаго золота, по прошествіи шести дней, обнаружилось бользненною чувствительностію язвъ и возвышенною теплотою всей поверхности кожи; но отправленія желудка, кишекъ и почекъ оставались и почекъ неревязывать

cerato simplici, a muriatem auri продолжать вмъстъ съ отваромъ rad. Sarsaparillæ (3xvj для ежедневнаго потребленія).

До 22-го Декабря, наросты совершенно изчезли, а язвы очистились, выравнялись и покрылись розовыми, мясистыми сосочками.

Больной приняль 3½ грана auri muriatici, которое, 26-го Декабря, оставлено; а отваръ изъ сарсапарили даваемъ быль до 14-го Генваря, текущаго года.

Въ это время, не было уже на лиць и на тъль ни мальйшей язвинки, кромь безобразныхъ, гладкихъ, но не болящихъ рубцовъ на лбу, бровяхъ, на носу и подбородкъ; и самое отвердъніе лъваго яичка совершенно уничтожилось.

#### EPICRISIS.

Съ 1-го Марта, Унтеръ-Офицеръ Г. С. свободенъ отъ лекарствъ: всв органическія его отправленія совершаются правильно; а веселость и болрость духа, при укрыпляющемъ снъ, при достаточномъ потребленіи пищи, были такъ удовлетворительны, что онъ могъ бы оставить и лазаретъ, если бы полубльдный цвътъ лица и неблагопріятное состояніе атмосферы, тому не препятствовали.

## VII.

#### военно-госпитальныя замфчанія.

А. Годичный обзоръ вользней въ Рижскомъ военномъ Госпиталъ.

Извлеч. на рунописи, сост. Старш. Донт. Дъйст. Ст. Сов., Чорбою.

Съ 1-го Ноября 1835, по 1-е Ноября 1836 года, поступило въ Рижскій военный Госпиталь незначительное число больныхъ, получивния обыкновенныя бользии; одив только горячки имъли болье или менье воспалительный характеръ, зависъвшій, по видимому, отъ годичнаго времени, частой перемьны погоды, рода жизни и т. д.

Ежемьсячная прибыль больных простиралась отъ трехъ до пяти сотъ человъкъ; а въ продолжение всъхъ двенадцати мъсяцевъ, прибыло 4,677 больныхъ. Значительнъйшая прибыль оказалась въ Генваръ, Февралъ, Апрълъ, Маъ, Іюлъ и Октябръ, мъсяцъхъ.

Повальныхъ и заразительныхъ бользией не

было; но нъкоторыя бользии (разнаго рода горячки и воспаленіе легкихъ) встръчались чаще прочихъ. Горячки сначала не всегда имъли опредълительное свойство, послабляющее, или нервное: потому что постоянно сопровождались мъстнымъ, какимъ-либо воспаленіемъ. Часто горячки сначала показывали характеръ нервный, но, послъ нъкотораго пособія, особливо послъ кровопусканія, тотчасъ перемънялись въ обыкновенную горячку, и больные скоро выздоравливали. Другія горячки сначала казались послабляющими, но въ послъдствіи принимали характеръ нервной горячки.

1-е. Горячки, сопровождаясь мъстными страданіями какой-либо внутренности (легкаго, печени, желудка, кишекъ и проч.), сперва требовали противовоспалительнаго леченія. Неръдко случалось, что послъ общаго кровопусканія бользнь уже прекращалась; но, большею частію, по причинь остающихся еще мъстныхъ страданій, повторяемо было (при полнокровности больныхъ) кровопусканіе, и сверьхъ того, къ страдавшему мъсту приставлялись піявки, или кровососныя банки, съ присовокупленіемъ внутренняго употребленія Mist. nitrat. potassæ, или же, смотря по надобности, Mist. muriat. ammon.

stib., Ph. Castr. Такъ: при сухости и чистотъ
языка, при отсутствін чувства тошноты и тяжести подъ ложечкою (scrobic.), назначались,
mist. nitrosa, приготовленная безъ мятной воды,
или decoct. hordei съ селитрою; а при гастрическихъ припадкахъ, предписывалась mist. mur.
аттоп., приготовленная безъ полыннаго экстракта, а потомъ даваемо было рвотное.

Въ случав сильнаго притеченія крови къ головъ съ болью и яснымъ раздражениемъ мозга, наибольшую пользу доставляли: припусканіе піявокъ къ носовой преградъ (Septum narium), прикладываніе холодныхъ примочекъ (изъ уксуса и воды) къ головъ, нарывныхъ пластырей къ затылку и горчичниковъ къ полошвамъ, треніе, теплымъ камфорнымъ уксусомъ, всего тъла. / Послъднее средство особенно дъйствительнымъ оказалось при сухости кожи и вообще въ нервныхъ горячкахъ, въ коихъ также съ пользою назначалось частое смазывание засохщаго языка кисломедомъ (oxymel), смъщаннымъ съ малымъ ствомъ нашатыря и селитры, — какъ средство, смягчающее и прохлаждающее языкъ, а потому доставляющее большое облегчение, въ горячкахъ. Къ поддержанію надлежащаго испражненія ниприлагаемо было надлежащее стараніе.

Обыкновенно питье больных состояло изъ decoct. hordei cum oxymelle; но я всегда позволяю больнымъ, вмъсто этого декокта, пить чистую воду; и кажется, можно, предпочтительно въ горячкахъ, давать съ умъренностію пить ключевую воду: потому что чистая вода есть лучшее: прохлаждающее питье, и не подвергается никакому броженію. Симъ способомъ горячки вообще были лечимы съ большимъ успъхомъ; доказательствомъ служитъ то, что изъ числа 1022 больныхъ, страдавшихъ горячками, умерло 45-ть. Въ этомъ числъ умершихъ было нъсколько такихъ больныхъ, кои привезены почти безъ чувствъ, умирали чрезъ сутки; и тогда всъ врачебныя пособія остались тщетными.

2-е. Лихорадки. Въ теченіе года, прибыло 204 больныхъ, имъвшихъ перемежающуюся лихорадку, которая излечивалась весьма скоро, и потому не оставляла послъдствій, свойственныхъ продолжительнымъ лихорадкамъ. Успъшное леченіе лихорадокъ зависьло отъ предварительнаго приготовленія больныхъ къ принятію противолихорадочныхъ лекарствъ. Съ этою цълью, въ продолженіи времени, предшествующаго лихорадочному пароксизму, предписывается Mistura muriatis ammoniæ stibiata;

предъсамымъ же пароксизмомъ, если нътъ явныхъ противупоказаній, больной принимаеть рвотное, такъ чтобы оно подъйствовало при самомъ началь пароксизма, т. е. предъ появленіемъ озноба. Вивств съ тьмъ, за нъсколько предъ пароксизмомъ, больной долженъ отказаться отъ принятія пищи, а во время самаго пароксизма, утолять жажду чрезъ одно только полосканіе: рта чистою водою, ромашкового наливкого. Не обременивъ желудка нищею и питьемъ, больной, по окончаніи пароксизма, чувствуеть гораздо меньшую тягость, и скорве получаетъ пользу отъ употребленія хинина, или другихъ лекарствъ. При сихъ условіяхь, лихорадка не можеть долго продолжаться; второй приступъ ся уже измъняется и бываетъ гораздо легче. По совершенномъ окончании лихорадки, нужно, еще нъсколько времени, наблюдать осторожность въ діэть.

3-е. Воспаленіе въ груди. Больных этого рода было 329. Недавно начавшееся воспаленіе всегда благополучно оканчивалось при употребленіи извыстных противовоспалительных средствъ. По прекращеніи главивйших воспалительных припадковъ, употребленіе misturæ nitratis potassæ, или decoct. hord. cum nitro,

продолжаемо было еще нъсколько дней, и тъмъ оканчивалось леченіе. Смертельный исходъ бользіни, или переходъ ел въ легочную чахотку слъдовалъ только у тъхъ больныхъ, которые, или весьма долго оставаясь въ командахъ, или изъ отдаленныхъ этаповъ поступая въ Госпиталь, находились уже въ весьма трудномъ состояніи.

4. Поносо. Въ течение года, больныхъ поносомъ было 242. Изъ нихъ умерло 27. Большею частио, бользнь эта не имъла злокачественнаго свойства, и весьма скоро излечивалась. Нъсколько человъкъ страдали вмъстъ поносомъ и цынгою, и потому требовали особеннаго ониманія. Неблагополучный исходъ поноса встръчался вреимущественно въ такихъ случаяхъ, когда хроническія бользни въ послъдствіи оканчивались поносомъ, какъ-то, между прочимъ, было у нъсколькихъ стариковъ, имъвшихъ отъ 70-ти до 90 льтъ.

При леченіи, внутрь назначались: emulsio eleosa Ph. castr., угольный порошокъ съ магнезіею и Доверовымъ порошкомъ (Rp. carb. tiliæ, magnes. alb., pulv. Doweri, an gr. jjj, Eleosachari menthæ, vel fæniculi gr. jj. Dentur tales doses No. jjj. S. Ter sumat quoti-

die pulv. unum), питье изъ dec. orchidis mor. Въ животъ, покрытый суконнымъ набрюшникомъ, втиралось теплое деревяное масло. Въ случав боли и ръза, приставлялись банки, или пілвки, къ животу, а при полнокровіи иногда назначалось кровопусканіе. Въ натужномъ поносъ полезными оказались: припусканіе пілвокъ къ заднему проходу, клистиры изъ крахмала, раствореннаго въ ромашковой наливкъ, притомъ внутреннее употребленіе теплой, мятной наливки (мятный чай).

5-е Венерическая бользнь. Между встми, досель испытанными, способами леченія любострастной бользии, меркуріальныя средства, по видимому, остаются върнтишими. Безуспъшность употребленія сихъ средствъ можно всего скорье приписать не надлежащему назначенію, или неудачному выбору меркуріальнаго препарата. Притомъ не вст меркуріальные препараты имьють равную силу; а потому, при тщательныхъ наблюденіяхъ, можно бы опредълить: въ какой степени бользни и при какихъ обстоятельствахъ должно преимущественно употреблять то, или другое меркуріальное средство? Такъ, многими уже замьчено, что при венерическомъ пораженіи носовыхъ костей и при венериче-

скихъ наростахъ на головъ (tophi), преимущественную оказываеть пользу mercurius præcipitatus ruber, въ пилюляхъ, или въ порошкакъ; въ застарълыхъ венерическихъ опухоляхъ и отвердъніяхъ на костяхъ конечностей, сопровождаемыхъ ломотою и разнаго рода сыпями, весьма благотворно дъйствують Плюммеровы пилюли (Pilulæ alterantes Plummeri), съ давняго времени успъшно употребляемыя много въ этихъ бользияхъ. Вступивъ въ должность Старшаго Доктора при Рижскомъ военномъ Госпиталь, я нашель здысь болье 50 больныхь, страдавшихъ весьма упорною венерическою ломотою въ конечностяхъ. При употребленіи Плюмеровыхъ пилюль, накоторые изъ этихъ больныхъ, на 8 и 9-й день, чувствовали уже облегчение, чрезъ 12-ть дней, могли уже свободнъе дъйствовать членами, а чрезъ три недъли, начинали ходить безъ помощи костылей. Съ такою же пользою, Плюммеровы пилюли употребляемы были при застарълыхъ сыпяхъ и другихъ венерическихъ страданіяхъ.

Способъ составленія и употребленія сказанныхъ пилюль состоитъ въ слъдующемъ: надобно взять Submuriatis hydrargyri gr. 40, Oxydi stibii gr. 20, Extracti conii et extracti Glycyrrh. 57 gr. 80, pulv. rad. Glycyrrh. gr. 100. Изъ этой массы составляется сто шест-десять двухгранныхъ пилюль. Слъдовательно каждая пилюля содержить: Submuriat hydragyri 1/4 gr., Sub oxydi stibii 1/8 gr., Extract. conii maculati et extract Glycyrrhizæ gr. j, pulv. rad. Glycyrrh. 5/8 gr.

Пилюли сін даются больному такъ: сначала на ночь една, на другой день, утромъ одна, а вечеромъ двъ, на третій день, утромъ двъ, а вечеромъ три. Далькъйшее прибавленіе числа пилюль, въ сказанномъ порядкъ, надобно продолжать до совершеннаго облегченія бользии. избъгая однакожъ слинотеченія. А потому, какъ скоро больной почувствоваль нъкоторую боль, или зудъ въ деснахъ, немедленно нужно остановить употребление пилюль, и не прежде, какъ чрезъ нъсколько дней, и по укръплении десенъ, снова давать пилюли въ уменшенныхъ пріемахъ, или въ томъ пріемъ, на коемъ больной остановился, и такъ продолжать нъсколько дней, вовсе не увеличивая пріема. Въ другихъ же случаяхъ, гдъ находится большая наклонность къ слинотеченію, нужно пилюли вовсе оставить, и только по украпленіи десень, возобновить пріемы съ одной пилюли. Доставивъ больному

желаемое облегчение, надобно приемы пилюль уменшать въ такомъ же порядкъ, въ какомъ они увеличиваемы были. Вилсть съ симъ, защищая больнаго отъ простуды, нужно назначить ему легкую пищу, а для пптья decoctum guajaci, или graminis, или car. arenar. При сопряженіи венерической бользии съ цынгою (какъ-то замъчено у многихъ больныхъ, въ теченіе 1836 года поступивших въ Рижскій военный Госпиталь), нужно сперва употреблять противоцынготныя средства, а потомъ уже приступать къ осторожному употребленію пилюль, которыя однакожъ даются, по вышесказанному, только утромъ и вечеромъ: а потому, въ теченін дня, могуть быть употребляемы противоцынготныя средства безъ кислотъ, наприм. аирный порошокъ съ угольнымъ порошкомъ (Яр. pulv. Acori calami aj, pulv. Carb. ligni Tiliæ oc. M. D. S. s. quotidie pulv. tres, v. quatuor.) и другія горькія средства; притомъ боляція мъста, особенно на ногахъ, обкладываются суконками, намоченными отваромъ ароматныхъ травъ; а десны укръпляются полосканьемъ изъ decoct. acori calami cum alumine crudo n проч.

По окончанін леченій пилюлями, предписы-

ваются ванны, сначала сърнопеченочныя (отъ 4 до 6), и потомъ простыя, отъ 4 до 6); температура послъднихъ должна постепенно доходить до степени лътней воды.

Первоначальные венерическіе припадки, язвы и перелой, лечимы были, обыкновенными способами. Что же касается до паховиковъ (bubo vener.), то они найдены у большей части больныхъ, поступавшихъ венерическихъ число коихъ было 507. Леченіе Госпиталь, паховиковъ состояло въ следующемъ: паховикамъ, не большимъ и не перешедшимъ еще въ нагноение, прикладывались нарывные пластыри. Слъдствіемъ сего было, большею частію, разръщеніе и совершенное исчезаніе паховиковъ, послъ чего однакожъ немедленно назначалось употребленіе выше упомянутыхъ пилюль. Къ паховикамъ, имъвшимъ значительную величину, твердымъ, болящимъ, рдъющимъ угрожающимъ общирными нарывами, приставлялись піявки (8—12), размыщаемыя въ окружности, или даже на самой поверхности пахо-Посль приставленія піявокъ, нерьдко многократнаго, боль въ паховикъ исчезала, а величина его примътно уменшалась; и хотя посль сего, въ нъкоторыхъ случаяхъ, следовало

нагноеніе, однакожъ оно было незначительное, и послъ нъсколькихъ припарокъ оканчивалось произвольнымъ вскрытіемъ нарыва.

6-е. Иынга. Больныхъ сего рода было не много; но, какъ выше уже упомянуто, большая часть больныхъ, имъвшихъ лихорадки, поносъ -и венерическую бользнь, обнаруживали не малую наклонность къ цынгв. Противъ бользии этой ст. наибольшею пользою употребляемы были пивные дрожжи и decoctum calami aromatici succo citri. Не безполезными также оказались порощки: pulv. carbon. ligni tiliæ и pulv. rad. calami aromatici. Такъ, при поносъ сопряженномъ съ цынгою, всегда давались, кромъ emulsio oleosa, порошки, упомянутые при леченіи поноса. А при цынгь назначались порошки: изъ pulv. acori calami э, pulv. carbon gr. jij, pulv. zingiberis gr. jij, три раза въ день. Питье состояло изъ decoct. antiscorbut., или cerevis. antiscorbut. Отвердълости на ногахъ обвертывались суконками, намоченными въ наливкъ specier, aromat. cum acet. vini. Для полосканія рта служилъ отваръ ароматныхъ травъ съ квасцами и проч.

7-е. Воспаленіе глазъ. Съ 1-го Ноября 1835 по

1-е Ноября 1836 года, прибыло въ Госпиталь 183 больныхъ, страдавшихъ воспаленіемъ глазъ: катарральнымъ, ревматическимъ, золотушнымъ, венерическимъ и гноеточивымъ, а равно разными послъдствіями воспаленія глазнаго.

Въ катарральных воспаленіях , которыя почти всегда бывали хроническія , редко пособляли піявки, пли кронососныя банки и холодныя иримочки: Гораздо большую пользу доставляли: мъшечки съ ароматными травами и камфорою, или безъ оной, мазъ изъ красной, или бълой ртути, растворъ сулемы съ каплями лавдана. Средства сіи, подкрыпляемыя теплымъ содержаніемъ больнаго и внутреннимъ употребленіемъ легкихъ, потогонныхъ средствъ, скоро разрышали воспаленіе.

Воспаленія ревматическія чаще случались, имъли скоротечный ходъ, и у людей молодыхъ, полнокровныхъ, сопровождались лихорадочными припадками, сильною, колючею болью нетолько самыхъ глазъ, но и другихъ частей головы. Въ такихъ случаяхъ съ пользою назначались: кровопусканіе, приставленіе піявокъ и кровососныхъ банокъ, холодныя примочки изъ слизистыхъ отваровъ сит aqua opii, а внутрь слабительныя средства. По уменшеніи воспале-

Digitized by Google

нія, прикладывались ароматные мъшечки съ камфорою, а также нарывные пластыри приставляемы были на затылокъ, за уши, на виски; внутрь предписывались легкія потогонныя средства изъ сюрьмяныхъ препаратовъ. При появленіи небольшихъ язвинокъ, назначался, для наружнаго употребленія, растворъ изъ Lap. devin. и лавдана; а при большой свътобоязни опій съ слиною втираемъ былъ въ виски, надъ бровями.

Въ золотушном воспалени глазъ, всего чаще случавшемся и почти всегда хроническомъ, сначала предписывался внутрь tart. tartarisatus, къ коему неръдко прибавляемы были: rheum, jalappa, cremor tartari; либо же назначался calomel c. rad. jalappæ. По уменшенін воспаленія, даваемы были сюрьмяные препараты, жина въ 'дорошкъ, или отваръ, съ горькими экстрактами, ирнымъ корнемъ, murias calcis, barytæ. При большой чувствительности глазъ употреблялись примочки изъ отвара Belladonæ, Нуовсуаті и т. п. При застарълыхъ и часто возвращавшихся, воспаленіяхъ сего рода поле-, зны были: втираніе unguenti stibiati за ущами, прикладываніе emplastri stibiati къ затымку, заволока.

Венерическое воспаленіе глазъ вообще сопровождалось сильною болью, которая обыкновенню ожесточалась къ ночи и сопровождалась лихорадочными припадками; а потому для полнокровныхъ особъ необходимы были кровопусканія и приставленіе піявокъ. При менъе сильномъ воспаленіи втиралась около глазъ ртутная мазь съ опіємъ, экстрактомъ белладоны, белены. Вмъсть съ тъмъ, производились втиранія ртутной мази въ конечности, либо же назначалось внутреннее употребленіе сулемы, по способу Дзонди, или Плюммеровыхъ пилюль. Для питья служиль decoct. Sarsaparil., Bardanæ, а для примачиванія глазъ, растворъ сулемы съ mucil. G. arabici и нъсколькими каплями лавдана.

Забольвшіе гноеточивыма воспаленіемъ глазъ прибывали въ Госпиталь всегда уже при посльднемъ періодъ бользни этой; а потому исходъ ел быль различный. При гноетеченіи назначалось частое промываніе глазъ чистою водою и впрыскиваніе ел, посредствомъ сифона, подъ въки, продолжаемое до прекращенія воспаленія. При жестокой боли въ глазахъ, общія и мъстныя кровопусканія приносили пользу; но, по большей части, необходимо было повтореніе приставленія піявокъ, или кровососныхъ банокъ.

Мясистые наросты соединительной плевы вырызываемы были; а для примачиваніл глазь употреблялся растворъ sulph. cupri, или свинцовая вода. Равно и голова примачивалась холодною водою, а внутрь предписывались слабительныя. По прекращенін воспаленія, впускались въ глазъ, по каплянъ, растворы: sulphat. zinci, extracti saturni, sulphatis cupri, nitratis argenti, при чемъ, сообразно съ чувствитель. ностію соединительной плевы, увеличивалась, или уменшилась пропорція сказанныхъ средствъ, Но какъ больные сего рода въ Госпиталь поступали, по большей части, уже при исходъ воспаленія, при помраченіи роговой оболочки, изъязвленіи, срастьніи ея съ зрачкомъ, при выпаденіи зрачка, и т. п.: то, по уничтоженіи продолжавшагося сильнаго воспаленія, дальнвишев лечение располагалось по свойству оставшихся страданій.

Съ 1-го Ноября 1835, по 1-е Ноября 1836 года, произведены слъдующія, Хирургическія операціи:

- a) Amputatio cruris dextri. Показаніемь къ этой операціи было Caries ossium metatarsi. Больной вскорь выздоровряв.
  - b) Extirpatio bulbi oculi sinistri, съ отды-

леніемъ значительнаго количества жиру подобігаго вещества (Steatoma) изъ глубины глазной впадины.

Съ 1-го Ноября 1835, по 1-е Ноября 1836 года, въ Рижскомъ военномъ Госпиталъ умерло 331, выздоровъло 4191. Смертельный исходъ бользией къ благополучному ихъ исходу содержался почти такъ, какъ 1: 14.

Б. Годичный обзоръ бользней въ Брестъ-Литовскомъ военномъ Госпиталъ.

Извлег. изв рукописи Старии. Докт. Надв. Сов. Шрейбероль.

Брестъ-Литовскій военный Госпиталь, при продолжающейся еще постройкъ зданія, собственно Госпитальнаго, номещенъ въ казармъ арестантскихъ ротъ, а также въ загородномъ Отдъленіи, въ 8 верстахъ находящемся, и назначенномъ для лютилго помъщенія всъхъ больныхъ, одержимыхъ хроническими недугами. Возвышенное, на берегу ръчки Льсни, положеніе загороднаго Отдъленія Госпитальнаго, окруженнаго съ трехъ сторонъ сосновымъ льсомъ, а съ четвертой общирною открытою равниною, вполнъ соотвътствуетъ этому назначенію, и суще-

ственно содъйствуя къ благополучному исходу унорнъйшихъ бользней, ясно доказываетъ, ито въ правильной діеть и чистомъ деревенскомъ ноздухъ заключается весьма важное условіе, для излеченія хроническихъ страданій.

Самое большое число больныхъ, поступившихът въ Госпиталь, прибыло въ льинее время изъ, войскъ, находящихся при кръпостныхъ работахъ, и изъ 4-го пъхотнаго Корпуса, слъдовавтияго въ Царство Польское; а въ зимнее время, изъ войскъ гарнизонныхъ, инвалидныхъ ротъ м! переходящихъ командъ.

Холодная и сырая погода, съ густыми и продолжительными туманами, въ Нолбръ мъся- цъ, явное оказывала вліяніе на ходъ бользией, хроническихъ, особенно чахотокъ, коихъ смертельный исходъ весьма ускорялся. Горячки и перемежающіяся лихорадки, въ этомъ мъсяцъ, получили болье нервное свойство, притомъ всетда сопровождались продолжительного слабостію и наклонностію къ возвратамъ. Сверхъ того, прибыло нъсколько больныхъ, имъвшихъ злокачественную жабу (angina maligna).

Генварь мьсяць отличался перемънчивою температурою воздуха. Холодь и теплота, дождь и метель, часто смънялись. Число хропическихъ

бользней въ Госпиталь увеличилось. Почти у всехъ больныхъ, поступившихъ, въ это время, въ Госпиталь, сперва замьчались разнообразныя страданія воспалительнаго свойства; но, по удаленіи первоначальныхъ, воспалительныхъ припадковъ, ясно открывался хроническій характеръ бользней, которыя обыкновенно представлялись, какъ носледствія тяжкихъ недуговъ, въ прежнее время перенесенныхъ, а потому имъли, большею частию, неблагополучный исходъ. Впрочень, въ числь больныхъ, въ этомъ месяць поступившихъ въ Госпиталь, было нъсколько такихъ, которые страдали скоротечнымъ ревиатизмомъ въ суставахъ (Rhenmatismus articulationum acutus); сверхъ того, прибыло 18 больныхъ, страдавшихъ послъдствіями ознобленія (Pernio).

У такъ больных, которые въ теченіе Мая масліца поступали въ Госпиталь, оказывались глазныя бользни, перемежающіяся лихорадки и послабляющія горячки. Не малая часть больныхъ сего рода прибыла изъ войскъ, сладовавшихъ изъ Царства Польскаго. Впроченъ, сильныхъ горячекъ и жестокихъ глазныхъ поспаленій почти не замъчено. Общій карактеръ бользней былъ катарральный.

Въ Іюнь мъсяць, оказывались быстрыя перемъны въ атмосферной температуръ (отъ 9° до 28° Р.),
сопровождавшіяся частыми и сильными вътрами,
съверо-восточными и юго-западными, бурями и
непогодами. У больныхъ, большею частію, уроженцевъ съверныхъ Губерній, поступавшихъ тогда
въ Госпиталь, замъчались воспаленія внутреннихъ
органовъ: мозга, легкихъ, подреберной плевы,
печени, селезенки, кишекъ; но подъ этими воспаленіями, большею частію, скрывались перемежающіяся лихорадки и послабляющія горячки,
такъ что, по уничтоженіи мъстнаго воспаленія,
тотчасъ обнаруживался правильный, послабляющій, или перемежающійся типъ, и леченіе
оканчивалось средствами противулихорадочными.

Съ Іюля по Октябрь мъсяцъ, продолжалась постоянно теплая и сухая погода, за коею послъдовала, въ Октябръ, сырая и холодная погода. У больныхъ, поступавшихъ тогда въ Госпиталь, проявлялись нервныя страданія, жестокія воспаленія внутренностей, а также упорныя, перемежающіяся лихорадки. Въдомость о больныхъ, въ Брестъ-Литовскомъ военномъ Госпиталъ состоявшихъ съ 1-го Ноября 1835, по 1-е Ноября 1836 года.

| Названів бользней.      | Къ I Но-<br>яб. 1836<br>состояло: | Приб. въ<br>течепін<br>года: | Выздоро-<br>вцю: | Умерло:    | Къ 1 Но-<br>яб. 1856<br>состоитъ: |
|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------|------------|-----------------------------------|
| Febris continua         | 38                                | 750                          | 764              |            | 24                                |
| - remittens             | 1                                 |                              | 1                | _          | -                                 |
| intermittens            | 46                                | 573                          | 597              |            | 22                                |
| - nervosa               | 5                                 | 73                           | 53               | 20         | 5                                 |
| hectica                 | 20                                | 96                           | 1                | - 98       | 5<br>17                           |
| Phrenitis               | <b>!</b> —                        | 1                            | 1                | _          |                                   |
| Ophthalmia              | 34                                | 345                          | 352              |            | 27                                |
| Angina                  | 1                                 | 30                           | 30               | i. — i     | 1                                 |
| Pneumonia               | 28                                | 183                          | 185              | 7          | 10                                |
| Pleuritis               | _                                 | 87                           | 80               |            | 7                                 |
| Gastritis               | 2                                 | 17                           | 18               | <u>'</u> — | . 1                               |
| Enteritis               | 1                                 | 29                           | 23               | 4          | 3                                 |
| . Hepatitis             | 2 4                               | 17                           | 18               |            | 1                                 |
| Lienitis                |                                   | 33                           | 34               |            | 3                                 |
| Haemoptoe               | 1                                 | 9                            | . 8              | 6.3        | 3<br>2                            |
| Phthysis                | 18                                | 94                           | 5                | 93         | 14                                |
| Catharrhus              | 5                                 | 15                           | 16               | 2          | 2                                 |
| Tabes                   | l —                               | 7                            | 5                | 2<br>9     | . :                               |
| Asthma                  | 10                                | 60                           | 53               | 9          | 8                                 |
| Obstructio viscerum.    | 6                                 | 32                           | 30               | \—         | 8                                 |
| Hydrops                 | 20                                | 70                           | 56               | 26         | [8]                               |
| Rheumatismus            | 18                                | 89                           | 94               |            | 12                                |
| Diarrhoea et dysenteria | 38                                | 74                           | 95               | 6          | 11                                |
| Epilepsia               | 1                                 | 8                            | 7                |            | 2                                 |
| Mania                   |                                   | 2                            | 2                |            | -                                 |
| Paralysis               | . 1                               | 3                            | 3                | 1          |                                   |
| Scrophula               | 4                                 | 14                           | 13               |            | 5                                 |
| Syphilis                | 65                                | 382                          | 412              |            | 25                                |
| Scorbutus               | 2                                 | 10                           | 12               |            |                                   |
| Scabies                 | 2<br>2<br>79                      | 69                           | .71              |            |                                   |
| Ulcera                  | 79                                | 506                          | 512              | _          | 73                                |
| Fráctura                | 2                                 | .6                           | 6                |            | 2 3                               |
| Contusio                | -                                 | 20                           | 17               | ·          | 3                                 |
| Итого                   | 454                               | 3695                         | 3585             | 268        | 296                               |

Слъдовательно, въ продолжение года, больныхъ состояло 4149, выздоровъло 3585, умерло 268. Смертельный исходъ бользней къ благополучному ихъ исходу содержался какъ 1:14.

Перемежающіяся лихорадки и послабляющіл горячки, особенно съ мыстнымы поражениемъ какого-либо органа сопряженныя, сперва лечимы были противувоспалительными и разрышающими лекарствами, къ коимъ неръдко присоединялись отвлекающія средства: горчичники и нарывные пластыри. По уменшеніи жестокости бользни и по удаленіи сложности ея, въ обоихъ сихъ случаяхъ употребляемы были средства противулихорадочныя; особенно сърнокислый хининъ, въ большихъ пріемахъ, составляль необходимое условіе къ совершенному выздоровленію. Конечно, нъкоторые больные выздоровъли при употребленіи однихъ только разръшающихъ и горькихъ средствъ; но были и такіе случаи, гдъ случайныя причины весьма препятствовали употребленію хинной соли; и здъсь-то именно появлялись завалы внутренностей, отеки конечностей и водяная бользнь, повсемственная слабость организма Следствіемъ сего было то, что выздоровленіе весьма замедлялось, а иногда и вовсе не наступало.

Воспаленія разных органовт и воспалительнаго ныя горячки требовали противовоспалительнаго леченія, примъненнаго къ степени бользив и сложенію больнаго. Обыкновенныя противовоспалительныя средства, наружныя и внутреннія, большею частію, соотвътствовали ожиданіямь Врача. Напротивъ того, большіе пріемы рвотнаго камня (tartarus emeticus), при воспаленіи мозга и легкихъ, ръдко могли быть назначаемы, и не всегда приносили пользу. Вообще, чъмъ ранъе употреблены были надлежащія врачебныя средства, тымъ скорье и върнъе наступаль благополучный исходъ бользни.

Нервныя горячки неръдко встръчались во всъ времена года, в по большей части, были последствіемъ воспалительныхъ горячекъ, или воспаленій. Наиболье это замъчалось между партіями рекрутъ и другихъ проходящихъ командъ, когда люди, заболтвшіе во время похода, долго не могли имъть надлежащихъ пособій, и съ упадкомъ силъ, или разстройствомъ какого-дибо органа поступали въ Госпиталь. Исходъ сихъ бользней, большею частію, былъ неблаго-пріятный.

Digitized by Google

У одного больнаго быль typhus petechialis; а насколько человакъ страдали ileitide, seu typho abdominali. Всв сіи больные выздоровали.

Леченіе нервныхъ горячекъ располагалось по періодамъ ихъ. Въ первомъ періодъ назначались ередства противовоспалительныя и разрышающія, - nitrum, calomel, salia neutra. Bo второмъ періодъ, отличавшемся тихимъ бредомъ, неравномърностію температуры тыла, дрожаніемъ конечностей, вообще явно начинающимся упадкомъ силъ, употребляемы были лекарства, легко-возбуждающія вибств съ потогонными,--infusum sambuci, angelicae, valerianae, acetas ammoniae liquidus, aqua laurocerasi, a также отвлекающія средства, многократно повторяемыя. Въ третьемъ періодъ, гдв наступаль уже явный упадокъ силь съ жидкими и невольными испражненілми, съ совершеннымъ безчувствіемъ, гдъ притомъ оказывался trismus maxillae inferioris, spasmus pharyngis et stuрог, съ пользою употребляемы были, въ накоторыхъ случалхъ, сильно-возбуждающія средства, горячія ванны, съ обливаніемъ головы колодною водою. Вообще горячія ванны, съ ббливаніемъ головы холодною водою, втираніе меркуріальной мази въ позвоночный столбъ и

внутреннее употребленіе aquae oxymuriaticae, seu acidi oxymuriatici (3В — 3j in 3vj aquae destillatae) оказались наиболье дъйствительными средствами.

Воспаление глазъ. Число бользней сего рода было незначительное. Впрочемъ, больные сін въ Госпиталь поступали преимущественно въ Іюлъ мъсяць; и наибольшая часть ихъ принадлежала къ войскамъ, находившимся на работахъ, именно же къ пъхотному Герцога Веллингтона полку, расположенному въ баракахъ, съ праваго фланга, на песчаномъ грунтъ. Въ прочихъ полкахъ, выгоднъе размъщенныхъ, воспаленіе глазъ ръже и слабъе проявлялось.

Частвитее, между видами глазнаго воспаленія, было катарральное (ophthalmia catarrhalis). Частое обнываніе глазь чистою водою, легкія слабительныя, противувоспалительныя средства и слизистыя примочки, достаточны были къ уменшенію сильнаго воспаленія: а легкія вяжущія средства оканчивали леченіе.

Ophthalmia purulenta замъчена была у нъсколькихъ человъкъ, изъ Витебскаго Егерскаго полка поступившихъ въ Госпиталь, вскоръ по прибытии войскъ на работу. Въ первомъ періодъ болъзни этой требовались средства противовоспалительныя: обильныя кровопусканія, иногда повторяемыя, многократное припусканіе значительнаго числа піявокъ, слизистыя примочки, слабительныя изъ среднихъ солей, calomel и проч. Во второмъ періодъ, при сильномъ слизенственіе съ опуханіємъ въкъ, при потемнъніи, или изъязвленіи прозрачной оболочки и при появленіи зернистости, нужны были больс возбуждающія, наружныя средства, между коими наиболье пособляли: solutio nitratis argenti fusi in aqua rosarum, а также втираніе въ въки и впусканіе въ глазъ сльдующей мази:

Rp. Oxydi hydrargyri rubri, opii puri, acetatis plumbi, aa gr. vj, butyri insulsi 5g. M. F. unguentum.

Нарывные пластыри, положенные на затылокъ и надъ бровями, и долго поддерживаемые,
также приносили большую пользу. Въ третьемъ
періодъ, при большой зернистости, при значительномъ потемнъніи, или изъязвленіи роговой
оболочки, при слабости въкъ, при развитіи
раппі et pterygii, употребляемы были вяжущія
примочки, прижиганіе nitrate argenti fuso et
sulphate cupri, натираніе въкъ oleo rorismarini, vel menthae pip., особливо при значительномъ разслабленіи мышицъ, сжимающихъ

глазъ, fonticuli ad brachia, vesicatoria perpetua, иногда setacea ad nucham. Въ этомъ періодъ, ophth. purulenta угрожаетъ наибольшею опасностію и весьма трудно излечивается.

Прочіе виды глазныхъ воспаленій (ophth. scorbutica, scropkulosa, syphilitica) лечимы были болье внутренними средствами, дъйствующими на самыя бользии, отъ коихъ воспаление зависъло; и частое промывание глазъ ръчною водою, легкими, вяжущими примочками, СЪ по малу всъ бользненные окажотрину мало припадки. Всъ больные, страдавшіе воспаленіемъ глазъ, по выздоровлении отправляемы были въ деревни, назначепныя для слабосильной команды, а оттуда переводились обратно въ полки. Наклонность къ возврату бользни вовсе не замъчалась.

Хроническія бользни. Свеже выжатые соки растеній, какъ иы изъ наблюденій удостоверимись, составляють ничемъ не заменяемое средство при леченіи заваловъ внутренностей и всякаго рода кахектическихъ бользней. Соки растеній, свеже выжатые, разводя стустившіяся мокроты и ускоряя отделеніе органическихъ влагъ, поправляють органы, служащія къ пищеваренію и питанію, и потому справедливо мо-

гуть быть названы кровочистительными средствами. Мы употребляли свъже выжатые соки, какъ чистые, такъ и смъщенные съ свъжимъ коровьимъ молокомъ и сывороткою. Обыкновенно къ шести унціямъ сока прибавлялись двъ унціи молока. Этотъ пріемъ, утромъ и вечеромъ назначаемый, мы увеличивали и уменшали, смотря по степени бользни и по силамъ пищеварительныхъ органовъ, и всегда видъли очевидную пользу. Въ легочномъ катарръ, сухоткъ, завалахъ внутренностей и золотухъ, большую пользу оказали свъже выжатые соки дикорастущихъ растьній, между коими преимущественно избирались: tussilago farfara, marrubium album, veronica beccabunga, veronica chamoedris, anchusa officinalis sen buglossum, betonica alba, leontodon taraxacum, triticum repens, sonchus oleraceus, cychoreum intybus, chelidonjum majus, saponaria officinalis, gentiana centaurea, meniathes trifoliata. Въ пынготной бользни употреблялся сокъ сосновыхъ и словыхъ молодыхъ шишекъ (turiones pini) и горькаго салата (lactuca scariola). Къ удобнъйшему назначению весенняго леченія весьма много способствуетъ загородное Брестъ-Литовскаго военнаго Госпиталя Отделеніе, называемое Катинборь; оно устроено на самомъ берегу текучей рычки *Льсны*, гда въ изобиліи растуть вышеупомянутыя растынія. Четырехъ-недыльное и шести-недыльное употребленіе ихъ всегда доставляло больныхъ желаемую пользу.

Водяная бользнь, безъ воспалительнаго состоянія появляющаяся, успышно лечима была мочегонными и потогонными средствами; въ повсемственной водяной (hydrops anasarca) бользни дъланы нъкоторымъ больнымъ насъчки (scarificationes) на разныхъ частяхъ тъла, неръдко доставлявшія существенную помощь.

Водяная бользнь, происшедшая отъ разстройства какого-либо органа, всегда оставалась неизлечимою.

Злокачественная жаба (Angina maligna), появившаяся между воинскими чинами, поступившими въ военный Госпиталь въ Ноябрь мъсяць, выходить изъ ряда обыкновенныхъ бользней, и по своимъ явленіямъ, заслуживаетъ особенное вниманіе. Въ нъкоторыхъ селеніяхъ, около Бреста-Литовскаго расположенныхъ на низкихъ и болотистыхъ мъстахъ, появилось злокачественное воспаленіе горла у дътей (Апgina infantum maligna). Нечыстота и тъснота

-акод вітивсья оюнириди оюнав икид адинкиж зни этой, поддерживаемой продолжавшеюся тогда непостоянною погодою. Дъти многихъ семействъ, пораженные сею бользнію, умирали, большего частію, въ продолженіе насколькихъ дней, даже неръдко въ продолжение нъсколькихъ часовъ. Въ концъ Ноября мъсяца бользнь эта такъ усилилась, что даже нижние воинские чины, въ зимнее время квартировавшіе въ сказанныхъ деревняхъ, заболъвали вмъсть съ дътьми, и поступая въ Госпиталь, имъли явленія и припадки злокачественнаго воспаленія горла (Angina maligna). Въ особенности, у полнокровныхъ и кръпкимъ сложениемъ одаренныхъ, людей оказывались слъдующие, предварительные припадки: боль головы, жаръ и холодъ, безпрерывно смъняющіеся, отвращение отъ пищи и слабость во всемъ тълъ; чрезъ нъсколько часовъ за тъмъ, обнаруживалась боль въ горль, препятствующая глотанію и прерывающая голось и дыханіе, такъ что больной, чрезъ 24 часа, поступая въ Госпиталь, имълъ уже горячку съ бредомъ, и весьма труднымъ дыханіемъ. Нёбная занавыска (velum palatinum pendulum) и миндалевидныя жельзки (Gl. amygdalæ) всегда находились уже въ омертвъ-

ломъ состояніи, съ большою опухолью на подбородкъ и распухлостію самаго языка. Чрезъ двое сутокъ, всегда открывались въ полости рта глубокія и нечистыя язвы, сопровождаемыя нервною горячкою. Не смотря однакожъ на открывшіяся уже злокачественныя язвы на пораженныхъ частяхъ рта, замъченныя у всъхъ сего рода больныхъ, при поступлении ихъ въ Госпиталь, одно только строгое, противувоспалительное лечение могло отвратить неблагополучный исходъ бользни. Обильное и многократное кровопусканіе, равно многократное приставленіе большаго числа піявокъ къ шев, сладкая ртуть, въ большихъ пріемахъ, прохлаждающее питье, а также ножныя ванны, нъсколько разъ повторенныя, вполнъ останавливали быстроту бользни съ ея гибельными послъдствіями; и леченіе оканчивалось мягчительными полосканьями. У нъкоторыхъ больныхъ, язвы въ полости рта оставались нъсколько (4 и болье) недель, и были такъ упорны, что иногда требовали мновяжущихъ и возбуждающихъ средствъ, и прижиганія ихъ селитрокислымъ серебромъ. Впрочемъ, всъ больные сего рода выздоровъли.

Летучій ревматизмь вы суставахь (Rheumatis-

тих articulationum acutus). Въ течение нъсколькихъ льтъ, бользнь эта вовсе не встръчалась въ здъшнемъ военномъ Госпиталь. Но, въ Генваръ мъсяць 1836 года, явилась она у многихъ больныхъ, имъвшихъ кръпкое сложение и полнокровныхъ.

Припадки бользни этой были сльдующіе: чувство слабости во всемъ тълъ, сильная боль въ поясницъ и горячка. Какъ горячка, такъ и сильная боль въ полсницъ, продолжались три и четыре дня; потомъ появлямись жестокія боли суставахъ сочлененій съ чувствительною опухолью, безпрерывно переманявшія мастопребывание свое. Боли, исчезнувшия на одномъ мъсть, тотчасъ появлялись на другомъ, и продолжаясь нъсколько недъль, многократно поражали каждый суставъ; а въ некоторыхъ слуна внутренніе органы. чаяхъ переносились Встрвчалось также развитие глубокихъ нарывовъ на разныхъ частяхъ тъла и страданіе соединительной плевы глазной. Къ вечеру болъзнь ожесточалась, а утромъ всегда ослаблялась. Внутреннія и наружным, противувосталительныя и потогонныя средства только въ началь бользии облегчали жестокость припадковъ ея; главное же леченіе состояло въ употребленіи возбуждающихъ и разрышающихъ средствъ. Горячія и ароматныя ванны много споспышествовали къ излеченію бользни этой, но вовсе не были достаточны къ совершенному выздоровленію больнаго.

Хинная соль (sulphas chinini) и самая хина, похваляемыя писателями, и въ большихъ пріемахъ употребленныя во время послабленія бользии (remissio), только на нъсколько дней останавливали дальнъйшій ходъ бользии и уменшали остроту болей; но для совершеннаго выздоровленія оказались также недостаточными. Переносъ этой бользии на легкія и образовавшієся внутренніе нарывы, у одного больнаго, имьли смертельный исходъ; прочіє больные выздоровъли.

Наружныя бользни. Почти третью часть больныхъ, лечимыхъ въ Рижскомъ военномъ Госпиталъ, составляютъ тъ, кои страдаютъ наружными бользнями. Частьйшія между сими бользнями суть язвы, за ними слъдуютъ венерическія страданія, потомъ сыпи. Кромъ того, встръчаются ушибы, переломы и вывихи.

Язвы. Раздъленіе язвъ на простыя, скорбутныя, золотушныя, ломотныя и пр., существенную доставляеть пользу, въ практическомъ значеніи; хотя впрочемъ между больными военнаго Въдомства ръдко встръчается одна, отдъльная порода язвъ; большею же частію, бываютъ онъ сложныя и сопряженныя.

Простыя язвы. Онь занимають наичаще нижнюю и боковыя части икры, переднюю часть голени, сторону лодыжекъ (maleoli), персты, словомъ, такія точки голени и стопы, которыя, по сравнительно большей выпуклости своей, болъе подвержены тренію, производимому сапогомъ, особливо во время продолжительныхъ походовъ. Пригонка сапоговъ на ногъ и защита обнаженной ноги отъ краевъ голенищъ, составляють не маловажное условіе къ предохраненію солдать оть появленія язвъ на нижнихъ конечностяхъ. Леченіе такихъ язвъ, у здоровыхъ впрочемъ особъ, весьма много облегчается чрезъ одно уже устранение раздражения и обмываніе чистою водою. Но если сіи язвы снова открылись чрезъ вліяніе холода, или влажности, наприм. при копаніи рвовъ, тогда онь бывають гораздо болье упорными. Здъсь видъ язвы, цвътъ и температура окололежащихъ мягкихъ частей, вялость, или напряженность ихъ, опредъляють выборь врачебныхь средствъ. При раздраженномъ состояни такихъ язвъ неръдко

требуются піявки, противувоспалительныя мягчительныя примочки и мази; при противуположномъ же состояніи ихъ назначаєтся обмываніе изъязвленной поверхности ароматными, наркотическими отварами и т. п. Само собою разумъется, что чистый бинть, компрессъ и мягкая чистая корпія, составляють основаніе перевязки.

Цынготныя язвы. Онв многократно встрычались, частію, какъ произведеніе цынги, частію же, какъ чисто мъстная бользнь. Такъ, напримъръ, люди, выздоровъвшіе отъ цынги, могуть потомъ, при усиленномъ только движении, или при продолжительныхъ трудахъ, снова нолучить сін язвы на прежнихъ, изъязвленныхъ частяхъ тъла, или близь оныхъ. Въ сихъ случаяхъ и одно мъстное лечение оказалось достаточнымъ. Однакожъ чемъ чаще открываются такія язвы, тъмъ болье онь распрострацяются. Намъ встръчались примъры, гдъ язвы такія занимали всю длину бедра и голени. Къ болъе мъстной цынгъ должно отнести и ть язвы, которыя образуются на ногахъ отъ продолжительнаго пребыванія въ водъ, при кръпостныхъ работахъ во рвахъ, особенно въ болотистыхъ мъстахъ. При лечени цынги и цынготныхъ

язвъ, степень ихъ опредъляеть выборъ средствъ врачебныхъ. Замътимъ только, что внутреннее употребленіе лимона (вмъсть съ коркою) раздьленнаго на четыре и даже на два пріема, окавываеть удивительное дъйствіе въ каждой степени цынги и цынготныхъ язвъ; истолченная корка лимонная, въроятно по большей удобноприкосновенія ея къ язвъ, пособлястъ гораздо болье, нежели покрывание язвы кружками, отразанными отъ лимона. Съ пользою употребляемы были также уксусныя примочки, а особливо fomentum pinea-balsamicum Ph. castr., сиотря по обстоятельствамъ, смъняемое cataplasmate davci carotæ. Впрочемъ, чистота и сухость воздуха, а также свободное размыщеніе больныхь, столько полезное для каждаго рода бользией, здысь составляють важныйшее условіе успъщнаго леченія; при чемъ, сообразно съ Госпитальнымъ положениемъ, въ пищу назначается такимъ больнымъ борщь, а для питья диво, настоенное храномъ. При губчатости и рыхлости язвъ сего рода прикладывались толстые илюмассо, намоченные колоднымъ уксусомъ и холодныя уксусныя примочки, коими покрывалась вся страждущая часть.

Зологнушныя лясы. Вообще больные сего рода

не охотно следують наставленіямь Врача, считая себя здоровыми; хотя бладность и брюзглость лица, явственно противуръчать тому. Изъ многихъ средствъ, похваллемыхъ въ этой бользни, преимущественно полезными оказались: ванны изъ ароматическихъ травъ, смъщенныхъ небольшимъ количествомъ наркотическихъ травъ; внутреннее употребление сурьмянныхъ препаратовъ, наркотическихъ экстрактовъ, свъжихъ соковъ крвпительныхъ растаній и крыпкаго кофе, приготовленнаго изъ ячменя и дубовыхъ желудей. Снаружи къ язвамъ прикладывались мягчительныя мази, или примочки, даже cataplasmata emollientia, особливо при раздраженномъ состояніи распухщихъ и изъязвленныхъ жельзъ; разрышающія же лекарства наружныя ускорлють опуханіе и изъязвленіе сосъдняго ряда жельзъ. Обкладывание опухолей жельзъ простымъ липкимъ пластыремъ приносило пользу, уравномъривая теплоту. На опухоли жельзъ твердыя, долго остававшіяся безъ всякой перемъны, весьма благотворно дъйствовало kali hydroidicum, употребленное по эндермическому способу, разрышая золотушныя опухоли, или приводя ихъ въ нагноение. Раздражающія наружныя средства часто ведуть здесь

къ рожистому воспаленію; а вскрытіе золотушной опухоли острымъ орудіемъ увеличиваетъ упорность язвъ такихъ.

Ломотныя язвы. У нижнихъ чиновъ военнаго Выдомства язвы эти суть слыдствіемь простуднаго страданія, вкоренившагося въ мышечныхъ волокнахъ мясистыхъ частей И BT. жильныхъ связкахъ суставовъ. Vinum colchici, extractum cicutæ, съра, и такъ называемые противуломотные декокты, назначаздъсь внутрь; сильные же дыйствуеть oxymurias hydrargyri, по 1/6 части грана въ сутки, даваемый съ камфорою и опіемъ, въвидъ пилюль. Снаружи предписываются общія и ножныя ванны. Посль ванны, втираніе мылкаго порошка florum sulphuris въ страждущую часть, покрываемую потомъ фланелью, или шерстянымъ лоскутомъ, доставляло большое облегченіе, при современномъ внутреннемъ леченіи. Не малую пользу приносила также паровая, уксусная ванна; но ничто досель не можетъ замънить употребленія минеральныхъ водъ.

Сложныя и сопряженныя язвы. Въ военной практикъ медицинской язвы сіи встръчаются довольно часто. Смотря по перевьсу той, или другой сложности, или сопряженности, внутрь

назначаются здась различныя средства врачебныя, иногда mercurialia, иногда antiscorbutica и т. д. Качество язвы укажеть на выборь мьстныхъ средствъ. Замьтимъ только, что въ тъхъ случаяхъ, гдъ pulv. carbonum cum china, acorus calamus, oleum pini laricis, fermentum panis cum creta, оказались безуспышными, — что тамъ acidum nitricum concentratum, снаружи употребляемое до появленія струпа (eschara), доставляло иногда особенную пользу.

Посльдствія ознобленія (Pernio). Люди, отморозивние какую-либо часть тела своего, обыкновенно поступають въ Госпиталь не прежде, какъ когда уже часть отмороженная перешла въ изъязвление, или омертвъние. Зимою, 1836 Госпиталь около 28-ми года, поступило ВЪ человакъ, имавшихъ отмороженные персты ножные. Не болье, какъ въ трехъ случаяхъ, найдено отморожение щекъ и кончика носа. За исключениемъ одного человька, доставленнаго изъ гор. Кобрина и страдавшаго помертвъніемь объихъ голеней, почти до половины ихъ, прочіе больные, но отдъленіи одного или двухъ, омертвълыхъ суставовъ перстныхъ, выздоровъли и\_ способными къ продолжению даже остались прежняго рода ихъ службы. Въ легчайшихъ

степеняхъ изъязвленій весьма успъшно дъйствовало linimentum calcareum. Ph. castr. Въ застарълыхъ изъязвленіяхъ пособляло прикладываніе намазаннаго на плюмассо unguenti: изъ jodi gr. xjj, kali hydriodici ejj, medullae ossium 3jj. У людей, одержимыхъ какимъ-либо худосочіемъ, язвы, оставщіяся посль отмороженія, многоразлично измънялись и вообще были весьма упорны. Весьма часто случалось, что сім язвы, усиліемъ искуства доведенныя почти до объятности зерна, оставались въ семъ положеніи весьма долго; прижиганіе такой язвы sulphate cupri, или lapide infernali и сухая корпія, - эти средства, ускоряющія заживленіе язсы у здоровыхъ особъ, здъсь имбли противное дъйствіе; не болбе пособляли ароматныя, наркотическія, или мягчительныя примочки и мази. Иногда изсколько разъ слъдовало уменшение и увеличение язвы, прежде нежели она вполнъ закрылась.

Венеритескія бользни. Если у больнаго, поступившаго въ Госпиталь, найдены ulcera syphilitica membri virilis, продолжающіяся уже около двухъ и болье недьль: то, котя бы не было еще язвъ во рту, обыкновенно назначасмо было внутреннее употребленіе сулемы.

Посему, послъ предварительнаго очищенія первыхъ путей чрезъ слабительное и послъ теплой ванны, больному сего рода назначалась комната, имъющая не менъе -- 18° теплоты, по Р. Для пищи опредъляется бульонъ съ булкою, а для питья decoct. specier. guajaci. Внутрь предписывають: pilulas oxymuriatis hydrargyri Pharm. castr., опредъляя, на пріемъ, одной пилюль, утромъ и вечеромъ, до пяти дней, и потомъ по двъ, также утромъ и вечеромъ. Одинъ разъ, въ недълю, больной садится теплую ванну, и получаетъ слабительное (изъ mести гранъ submuriatis hydrargyri съ однимъ скрупуломъ magnesiæ albæ). Количество пріемовъ вышесказанныхъ пилюль, потребное для излеченія бользии, опредъляется стеценью ея. Если lues не есть еще confirmata, то для излеченія ея достаточны шесть, или восемъ гранъ сулемы. Для излеченія же высшихъ степеней бользни требуется 10 — 12, даже 14 гранъ сулемы. На язвы во рту весьма успъщно дыйсьтуеть gargarisma oxymuriatis hydrargyri c. tinet. opii crocata. По окончанія меркуріальнаго леченія, опредъляется цълая недъля для сърныхъваннъ, ежедиевно назначаемыхъ; сверхъ того, предписываются: кръпкій декоктъ

изъ rad. sarsaparillæ и другихъ кровочистительныхъ корней, и чрезъ два дня, слабительное. Наконецъ, больной, употребивъ паровую баню, получаетъ первую Госпитальную порцію, и чрезъ нъсколько дней выписывается. Предписываніе pilul. охумиг. hydrargyri располагалось такъ, что къ десяти гранамъ сулемы прибавлялись: opii puri 12 гр., g. res. guajaci 15 гр., extr. hyoscyami 1 скруп.

Что касается до венерическихъ паховиково (bubones), то при упорной затвердълости ихъ пользою употребляемъ быль следующій способъ: затвердълое мъсто сперва покрывалось empl. vesicatorio, а по снятіи нарывнаго пластыря, прикладывалось къ такому мъсту плюмассо, намоченное растворомъ двадцати гранъ oxymuriatis hydrargyri въ одной унціи воды. Слъдствіемъ сего было либо разрышеніе, либо нагноеніе паховика. Разрышеніе паховика несопряжено здъсь съ какою либо опасностію: потому оно достигается обильнымъ отдъленіемъ. или выпотъніемъ влаги. Обыкновенно, послъ приложенія плюмассо на два часа, является струпъ, на который накладывается мягчительная припарка. Прикладываніе какъ нарывнаго пластыря, такъ и плюмассо, намоченнаго сказаннымъ растворомъ, иногда пужно повторять до трехъ разъ. При вскрытіи нагноившагося паховика, разръзы производимы были во всю длину его, дабы отвратить свищи.

Больэни кожи. За исключеніемъ чесотки, накожныя бользни редко встрьчались у больныхъ, поступившихъ въ Госпиталь. У рекрутъ замъченъ особенный родъ чесотки, которая имъла всъ наружные признаки обыкновенной чесотки, но не была заразительною, и занимая всъ части тъла, ни мало не появлялась между перстами. Чесотка эта происходила, по видимому, отъ перемъны крестьянской одежды на солдатскую, и весьма скоро излечивалась при употребленіи однъхъ только паровыхъ бань.

Переломы, вывижи и ушибы. Встръчались нъсколько разъ простые переломы, которые всегда имъли благополучный исходъ. У нъсколькихъ человъкъ замъчена самая легкая степень вивижатотів; полныжъ же вывижовъ не было. Въ числъ больныхъ поступившихъ въ Госпиталь съ ушибами, находился одинъ, разбитый лошадьми и смятый тельгою. По укрощенін воспалительныхъ припадковъ и заживленіи поверхностныхъ ранъ головы, осталось бездъйствіе лъвой руки; — осмотръ не представлялъ ника-

кого видимаго разстройства, и больной не жаловался ни на какую боль въ рукъ, кисть ручная постоянно представлялась отекшею, нимало впрочемъ не теряя чувства. Всъ средства остались здъсь безуспъшными. Весьма бы было желательно испытать здъсь Электричество и Галванизмъ; но въ Госпиталь нътъ нужныхъ къ тому снарядовъ.

Хирургическія операціи. Въ теченіе года, произведены четыре операціи хиругическія, а именно отсьченіе: а) льваго бедра, б) праваго бедра, в) объихъ голеней, г) праваго плеча. Показаніємъ къ этимъ операціямъ были: въ первыхъ двухъ случаяхъ, обширная костоъда, въ третьемъ, омертвъніе, воспослъдовавшее отъ отмороженія ногъ, а въ четвертомъ случать, огнестръльная рана. За исключеніемъ третьяго больнаго, чрезъ два мьсяца посль операцій умершаго отъ послъдствій ушиба, прочіе больные выздоровъли.

# VIII.

см всь.

1.) Слина, въ Физіологическомъ и Патологическомъ отношении.

Замъчанія о слинъ, недавно изданныя Франц. Врачемъ, Алекс. Донне (Histoire physiologique et pathologique de la Salive, considerée particulièrement sous le Rapport des ses Usages, du Role que joue ce Fluide dans les Fonctions digestives et dans les Affections gastriques. Par Alex. Donné. Paris. 1836. 8.). заслуживають особенное внимание Врачей. Сущность замьчаній Г. Донне заключается въ сль-1) щелочное свойство слины давно дующемъ: уже извъстно, однакожъ въ новъйшія только времена ясно доказано особливо опытами Тидемана и Гмелина. 2) Со временъ Галлера до сихъ поръ, мы ничего новаго не узнали о Физіологическомъ значеніи этой влаги. З) Польза слины, по мнънію многихъ Физіологовъ есть,

во первыхъ, та, что чревъ слину овлажается роть, притомъ облегчается движение языка, а также разговариваніе и глотаніе; во вторыхъ, что слина, смъщиваясь съ яствами, приготовляетъ ихъ къ удобнъйшему растворенію чрезъ желудочный сокъ. 4) Прежніе и новъйшіе писатели ничего не упомпиають о цвли, или пользъ щелочнаго свойства слины. 5) Кромъ качествъ, обыкновенно пришисываемыхъ слинь, влага эта, по изслъдованіямъ Г. Доние, одарена способностію неутрализировать излишнюю кислоту желудочнаго сока. Это доказывается: а) неутральнымъ состояніемъ желудочнаго сока, которое большая часть испытателей нашла при пустоть желудка и при смъщении желудочнаго сока съ большимъ или меньшимъ количествомъ слины; б) неоспоримостію этого довода, явствующею изъ того, что кали, содержимое въ слинь, приходить въ соприкосновение съ кислотою желудочнаго сока; в) свойствомъ содержимыхъ въ желудочномъ сокъ солей, коихъ основою, по большей части, есть сода. 6) Измыненія въ составныхъ частяхъ желудка, именно же въ содержаніи кислоты его, найденныя всеми Фиэіологами, происходять оть большаго или меньшаго смъшенія этого сока съ слиною. Досель

никто не обратиль вниманія на это обстоятельство. Т) Двадцать четыре грамма слины (у Г. Донне́) неутрализирують одинъ сантиграмив соляной кислоты. 8) Количество слины, при здоровомъ состояній, отдъляемой въ продолженіе сутокъ, можно признать равнымъ 390 граммамъ; посему количество это можетъ неугрализировать 16 сантиграмиовъ соляной кислоты. 9). Щелочное свойство слины, въ здоровомъ состояній находимое, можеть, при извъстныхъ обстоятельствахъ, перейти въ кислое. 10) Кислота слины есть главная причина костобды зубовъ, часто встрвчающейся при хроническихъ страданіяхъ желудка. 11) По мнъвію всвяъ писателей, перемьны слины, или потеря ея, причиняють разстройство пищеваренія и худобу. 12) Куреніе табака не измыняеть щелочныхъ свойствъ слины; и въ этомъ отнощении, тъ люди, которые привыкли къ курению табака и притомъ не плюють, получають оть такого нуренія скорбе пользу, нежели вредъ. 13) Изгага и жженіе въ желудкъ и желудочная кислота, происходять: либо отъ излишней и неутрализнрованной кислоты желудочнаго сока, либо вообще отъ излишняго отдъленія желудочнаго сока, либо же отъ измъненія слины. На семъ

основывается польза щелочных лекарствъ. 14) Сокъ поджелудочной жельзы выроятно такую же пользу доставляеть китнелнома какую слина желудку. 15) Знаніе химическихъ перемънъ, происходящихъ въ отдъленныхъ влаважно въ Патологическомъ и Терапевтическомъ отношенін: потому что оно объясняеть ходъ бользней, и указываеть на первыя уклоненія отъ здороваго состоянія. 16) Главивищая химическая перемъна, замъчаемая въ слинь, есть кислота (кислость) ея, возникающая при вліяніи перемень пищеварительныхъ органовъ. 17) Bcero чаще эта кислота присоединяется къ раздраженному и воспалительному состоянию желудка, и можеть служить отличительнымъ признакомъ разныхъ страданій желудка. 18) Наконець, и эта перемъна слины можеть также подать поводь къ разстройствамъ въ животной экономіи, нарушая отправленія желудка и не защищая уже отъ вліянія излишней его кислоты. — Замьчанія Г. Донне. именно по очевидной важности ихъ, вполнъ достойны дальнъйшаго излъдованія и подтвержденія, со стороны другихъ Физіологовъ, Патологія и Терапія, получили бы больщую пользу, если бы можно было доказать, что кислая слина *всегда* замъчается при воспалительномъ состояніи желудка, и слъдственно должна быть разсматриваема какъ патогномическій признакъ воспаленія органа этого.

## 2.) Голубая моча.

Между всвии перемънами, замъчаемыми въ человъческой мочь, наиболье примъчательное, н по происхождению своему, весьма мало еще извъстное, есть измънение цвъта ел въ разныхъ бользняхъ. Браконо, разлагая голубую мочу, получиль, посредствомь процеживанія, голубое вещество, или такъ называемый имъ Ціантринг. Юлія Фонтенель, Можонь и Кантю утверждають, что цвать этоть зависить оть синильновислаго жельза. Какъ голубой цвътъ мочи обращаль на себя винманіе многихь Ученыхъ, то и я, говорить Г. Дранти (Revue médicale. Juillet. 1837,), пользуясь благопріятнымъ случаемъ, изслъдовалъ не большое количество голубой мочи, испущенной молодымъ человькомъ, который страдаль Гриппомъ. Эта моча была темно-голубаго цвъта; оставаясь въ поков, она давала голубой осадокъ, ямъвшій всв свойства свимльновислаго жельза (Hydrocyanate de fer). Какъ скоро прасящее вещество

это отделено было чрезъ прецаживание, то при разложения мочи оказалось большое количество бълковатаго вещества, студени, солей, съ признаками мочеваго начала (Urée). При этомъ достовърно извъстно было, что больной вовсе не иринималъ железныхъ препаратовъ

3.) Сравненіе трупоразъятій посль тифозной горячки, въ Дублинь, Парижь и Женевь.

Г. Ломбаръ, въ двухъ письмяхъ къ Професс. Tpescy (Dublin Journal September. No. XXVIII.) говорить, что онь, въ продолженіе шести льть, обращаль особенное вниманіе на трупоразъятія посль тифозной горячки, часто встрачавшейся въ Женевскомъ Госпиталь, и всегда при этомъ находилъ изъязвление кишекъ, постоянно замъчаемое, по наблюденіямъ Г. Лун, во Францін, и только изръдка въ Англін. Примары совершеннаго отсутствів кишечныхъ изъязвленій, посль смертельнаго исхода тифозной горячки, видель Г. Ломбарт въ Гласговь, гдь появление этихъ изъязвлений содержится только какъ 1: 3, а также въ Дублинъ, гдв онв еще ръже бывають, но, по различию эпидемій, изманяются въ болье или менве частомъ появлении своемъ. Не смотря однакожъ

на общее сходство бользык этой, оказались въ ней следующія размичія: инаствердой вемлы сказаниая сыпь тяфозная не Доходить до высокой степени, но поносы бываеты сильные; напротивъ того ; въ Англінои Ирландін, заразительность усимивается и стрядание двтей встрычается чаще, нежели въ Женевъ. Изъ этого Г. Ломбаръ заключаетъ: 1) что кишечное изъязвленіе нельзя признать вмъстилищемъ тифозной горячки, которая гораздо болье составляеты общее страданіе; 2) что людя, зібольний тифозною **горячкого**; могуть переносить / сливительный, лекарства чтораздо лучше въ Ангији, пржеди въ Парижъ п. Женевъ; 3) что надобно наблюдать осторожность въ принятіи инострацицікъ сроесбовь леченія: Бользиь, эта, пребусть дальный. ниго изявдованія. Въ Ливерпуль, Манчестерь, Бирининана: ис Лондонъ, она содоржится одинаковышт образоми: Г.: Л.: думаеть, ито Ирландія есть тнездо этихъ горячекъ, особливо заразительныхъ, догорыя онъ отличаеть отъ спорадическихъ горячекъ, повсюду встръчающихся в особенно оъ кишечнымъ изъязвленіемъ соединенныхъ. Мивніе сів онъ основываеть на томъ, что въ Англіи частое понвленіе бользим этой уменшается по мърв удаленія отъ пос тоянно

Дублина, откуда нутемественники привозять оную.

4.) Раздражение спиннаго мозга (Irritatio spinalis).

По минию Д. Малоне (American Journal of the medical Science. Novemb.—January. 1856), упреканіе Врачей въ незнакомствъ нкъ съ кущностію нервивіхь бользиви моглю бы, со вреженемъ, превратиться въ прославление мхъ, если бы жадиежащее внимание обращаемо было на средоточе первное. Многіе, неизлечивые ревиатизныт, паражичи, сердечныя боли: и жрутін нервибія втраданія, вногда же и самия михорадка перемежающаяся, потеряють свою ушорность, коль скоро Врачь не оставить безъ вниманія спинное раздраженіе, — чувствительность какой-либо точки позвоночиаго столба. Тапъ Г. Малоне упорнъйшую перемежающуюся михорадку успашно излечиваль чрезь миогократное прикладывание горчичниковъ между лопатками. Въ доказательство, приводить онъ также и слвдующій примъръ: «27-го Февраля, посътиль я «50-ти-льтняго Негра, который, при хорошемъ «твлосложении, досель оставался всегда здо-«ровъ. Опъ жаловался на сильную боль въ го«ловь, правой: стеронь груди; затымкь и въ «конечностяхь; вместь съ тъмъ замъчались: «полное, медленное жилобіеніе, жаръ и сухость «кожи и нечистота языка. Ускоренное дыханіе, «кашель и т. п., побудили меня предписать леккарства, употребляемыя противъ ревиатизна; но «это не принесло больному никакой «При дальныйшемы изслыдовании, я открыль двы «чувствительныя точки на позвоночномъ столбъ, ярдну на затылкъ, а другую на крестиъ. Давлежніе на порвую изъ этихъ почекть увеличивало жболь въ боку. Два нарывнымъ пластыря, пожложенные на эти точки, прекратили всю бо-«Абзнь, такъ что человакъ этотъ, на другой «день, продолжаль уже прежнів занятія свои.»

## 5.) Insolatto.

До сихъ поръ, бользнь эта разсматривается и лечится какъ ароріекіа cerebralis. Въ правильности такого взгляда на эту бользнь сомнълается Дж. Россель (London medical Gazette, April 1836), основываясь на ниже следующемъ обстоятельствъ. Въ Маъ мъсяцъ 1834 года, недавно прибывшій въ Мадрасъ, совершенно здоровый, полкъ провожаль на кладбище мертвое тъло одного Офицера. Это было вскорв послъ

объда, при чрежитрио жаркомъ вътръ, дувшемъ съптвердой зевли. Немедление миогіе солдаты визди възбезуувственность, и одинь изъ нихъ тотчасъ, а два чрезъ пъсколько часовъ, умерли. Припадки были слъдующіе: сильная жажда, чувство обморока, потомъ затруднение дыхания, хрипъніе въ груди, спячка, синева лица, и у одвого больнаго, съужение зрачка. (Прочие, у кожать развилась лихорадка, выздоровали, по исатеченіи одного или наскельких дней.) Мозгъ, устрехъ умершихъ, снайденъ въ совершенно -здоровомъ состоянін (за леключеніемъ небольжаго количества сыворотойной влаги, найденной жи основаніи черена, вы одножь случав); но легкія были чрезмирно переполнены импын черный цепьть; то же оказалось въ прапой половина сердца и главных сосудах его; въ одномъ случав, на мъсть легкаго, съ правей стороны сердца, найдена опухоль, которая заключала въ себъ 22 унціи сывороточной, желтоватой влаги, и во время жизни вовсе не была примътна. — Итакъ я, говорить Дж. Россель, думаю, что при этой бользни преимущественно поражается грудь (или самая кровь); а страданіе мозга есть здась, также какь и при накоторыхъ другихъ грудныхъ бользияхъ, вторичное. Во всякомъ подмакожъ случав, во время выздоровления, ментъ должен в быть свицащаемъ отъ сильныхъ зликорадочнымъ зпротиведъйствий сердца.

6.) Замъчанія о дъйствій Креозота на людей и животных с.

- 1. Kopnenianu (Journal de Chemie medicale. 4836.: Fevriend перединськия. Креозомы начиная отъ самыхызмалыкы до самых большихъ присмевь, притомы даваль это спедство внутрь. впрыскиваль выпены в уветребляль ано эндермическому, вспособу. Изветопытоват и наблюдений своихв. Кисательно сдбиствія: Креовотанна подей -эконаявелыциональный выпрошенсь в стантовиж в тія: (1) большой эпрість «Крепзота д принятый эрезь гродъс потинси прекращесть жизньс и при трупоразълтів : проміведенномъ тотчась посль емерти, пельяю открыть, никакого: органическаго поврежденів. 2) Чистый на насколько разведенный Креозоть, приложенный, даже въ месьма маломъ количествъ, къ обнаженному большому нерву (п. vagus), или впрыснутьй въ вены, тотчасъ убиваетъ. 3) Въ количествъ, еще меньшемъ, употребленный Креозотъ производить оцепентніе въ мышечной и нервной си-

стень; паражиные припадки въ конечностяхъ, сердик, грудобресшиой преграда и жь органахъ чувотвъ. 4) Кака срежства, противульйствующія тирина прина прина прина прина прина жичь общи светбуждающий зеверский, по крайней мвредимитьть сверь спекальеннество это не подвистычно жищения вжелу докъз на послванемъ случав, гнарковическій дородства, жақъ наприм. афиа: Івиго сегаві; ускорили бы смерто-ир Крескожь показываеть больелили менье сильтеми межанимонсимическоем дъйствие, причилиющее органическия порявотрейска, после долгаго употребления его находимыя въ трупики людей, коропые, опалакомъ случав, умирають тойн провинением провинения желудка и кишекъ. 6) оПретивъ экогодъйствія, Креозота, служать масапини санзиесын цитья Уксуст, жакъ средотво; прастворяющее Креозоть; усидиваеть это двиствіе его. 7) Вообще саный больтій пріємъ Креозота состоить: изъ двухъ капель, даваемых в четыре, или шесть разъ, въ 24 цаса. 8) Бользии, въ коихъ пользу доставляетъ внутреннее употребленіе Креозота, суть сльдующія: diabetes mellitus, polydipsia, hæmoptoë, catarrhus chronicus, diarrheea, palpitatio cor-

dis, и можеть быть, даже tetanus. 9) Внутрь принятый Креозоть тотчась возбуждаеть испражненіе мочн. Г. Корпеліани приписываеть это онъмьнію шейки кочеваго пузыря. 10) Наружное употребление Креозота полезно при хроническихъ накожныхъ бользияхъ, именно же при лишав и чесоткв. 11) Равно также простыя раны и язвы, при наружновъ употреблении Креозота, подсыхають и нокрымаются рубцемъ. 12) Если Креозотъ снаружи прикладывается къ необширной поверхности, или къ неважному нервному сплетенію: то онъ не оказываеть никакого вліянія на отдаленные органы, даже такіс, на которые онъ специфически двиствуеть, какъто: на мозгъ, становую жилу и почки. Однакожъ вдыханіе Креозова, при легочной чахоткъ, приводить какъ бы въ оцепеньлость умственныя способности и мышечныя движенія. 13) Хотя Креозоть, снаружи употребленный не прекращаетъ венозныя кровотеченія, по крайней мъръ, не останавливаетъ кровотечение изъ большихъ венъ, наприм. изъ бедренной вены, у овцы; однакожь онъ успашно дайствуеть ири кровотеченін изъ артерін умъренной величины. г. Юлія де Фонтенель къ этому всему присовокупляеть, что Креозоть съ пользою употребленъ быль для сбереженія анатомическихъ препаратовъ; что онъ свертываетъ бълковатое вещество и оказываетъ разрушительное дъйствіе на животный организмъ, и потому долженъ быть употребляемъ только въ весьма разведенномъ состояніи.

# 5.) Различіе въ дъйствіи мочегонных средствъ на отдъленів мочи.

Недавно J. Pareira (London medical Gazette. 1835. December.) составиль обзорь касательно количества мочи, въ одно и то же время (съ 9 до 2 часовъ) испражненной посль употребленія разныхъ мочегонныхъ средствъ, принятыхъ въ одномъ и томъ же количествъ жидкости. Между средними солями, всего сильные дыйствуеть sal. tartari; почти такую же силу имветь nitrum; но cremor tartari доставляетъ только половинное количество мочи. Четыре капли olei juniperi испражняли около 30 унцій мочи, между тъмъ какъ селитра доставляла только 22 унцін мочи. Почти также, какъ селитра, льйствуеть слабый пуншь; но посль принятія теплаго молока испражилется только половинное количество мочи.

6.) Испражните мний способъ леченія тивоз-

Деларокъ (Gazette medical de Paris. 1837. Mars. No. 11,), савдуя мивнію Щтолля, приписывавщаго тифозныя горячки избытку желчи, назначалъ больнымъ сего рода сперва рвотное, потомъ ежедневно давалъ имъ Зайдшицкую воду, или другое слабительное средство, и всегда находиль такое лечение довольно успышнымъ. Изъ ста больныхъ умерло только десять; и между сими испоторые, поступая въ Госпиталь, находились уже въ безнадежномъ состояни, а другіе приняты были посль предварительнаго кровопусканія. Піеданьель, при подобномъ леченіи, соединяемомъ иногда и съ кровопусканіемъ, потеряль изъ. 134, больныхъ 19, а Луи изъ 31 больнаго 3 (у двоихъ больныхъ былъ Typhus gravissimus). Андраль, при такомъ же леченіц, изъ 48 больныхъ, имъвшихъ typhum leniorem, не потеряль ни одного; изъ 11 больныхъ, имъвшихъ typhum graviorem, онъ потерялъ 2, а изъ 7 больныхъ, имъвшихъ typhum gravissimum, 6. Слабительныя средства никогда ожесточали бользни, но часто облегчали се. Съ 1833 по 1836 годъ, Андраль избиралъ смъщенлеченіе (кровопусканіе и слабительныя средствя) для 18 бельных вы коих умерло 6; одно телько кревопусканіе онь назначаль 27 бельным (въ темъ же числь, 9-ти трудно бельным), изъ коих умерло 6; однь телько разводящія средства онъ предписываль 11-ти бельным, не трудным, и они виолись выздоровьям. Изъ всего вышесказаннаго видно, по крайней мърь, то, что, при леченім тифераных горячекь, не надобно слишкомъ воздерживаться отъ употребленія слабительных лекарствъ.

# 7.) Incontinentia urinæ.

По наблюденіямь І. Мондіера (Presse medic. 1837. No. 19. 21.) надобно различать три вида інсоптіпентіге штіпте: 1) постоянное недержаніе мочи, 2) временное недержаніе мочи, истекающей по каплямь, 3) временное недержаніе мочи, истекающей струсю. Эти виды, особенно второй, встрычаются гораздо чаще, нежели какь обыкновенно кажется; притомь они бывають не у однихь только слабыхь, лимфатическимь сложеніемь одаренныхь, дьтей, не исчезають съ наступленіемь, возмужалаго возраста, и могуть быть излечиваемы и въ старческомъ возрасть. Крыпительныя лекарства (tonica) не излечивають этой бользни; но крыпительныя ле-

Digitized by Google

карства, дъйствующія вибсть на мочевые н дътородные органы, доставляють пользу. Ароматическія ванны неудобны и дороги. Польза Электричества требуетъ, по видимому, дальнъйшаго потвержденія. Приставленіе кровососныхъ банокъ (по совъту Каненя) къ срамнопроходной промежности двиствуеть не вырно. Мокса есть здвсь жестокое средство. Нарывныя средства дъйствуютъ чрезъ мочегонную свою силу: потому что Cantharides излечивали эту бользнь (по наблюденіямъ Морисета). Проведеніе въ моченспускательный каналь зонда, чистаго, или смазаннаго раздражающими веществами, приносить пользу. Наилучшее лекарство есть пих vomica. Между механическими средствами можио одобрить только тв, которыя прижимають моченспускательный каналь подъ лонными костями (вблизи musc. sphincteris).

8.) Леченіе Холеры чрезь соляныя впрыскиванія въ вены.

Докт. Макинтошь, Врачь при Госпиталь, учрежденномъ въ Эдинбургь, во время свиръпствованія тамъ Холеры, сдълаль сто пятидесяти больнымъ соляныя впрыскиванія въ вены; изъ этого числа больныхъ выздоровъло двадцать

нять. Столь малый, по видимому, успахъ леченія чрезъ впрыскиванія, вдосе однакожъ превыщаетъ число выздоровъвшихъ безъ употребленія впрыскиваній. Притомъ Д. М. замвчаетъ, что ни одинъ изъ больныхъ, коимъ сдъланы соляныя впрыскиванія въ вены, не могъ быть излеченъ чрезъ другія, какія-либо средства. Впрыскиваемыя вещества предписывались въ следующей пропорцін: muriatis sodae 3В, bicarbonatis sodae ају (эти пропорціи въ послъдствій удвоивались). aquae ib x. Температура впрыскиваемаго вены солянаго раствора простиралась отъ 1060 до 120°. Благотворное дъйствіе впрыскиванія ускорялось по мърв возвышенія температуры впрыскиваемаго раствора; однакожъ температура, превышающая выше означенную, была несносна для больныхъ. Успъшное дъйствіе впрыскиванія не мало также зависьло отъ тщательнаго приготовленія и осторожнаго употребленія впрыскиваемаго раствора. Для постепеннаго впрыскиванія: десяти фунтовъ жидкости требовалось не менъе полчаса. Впрыскиваемая жидкость закъ замъчаеть Д. М., съ удивительною скоростію оказы-. вала благотворное вліяніе:

1) на жилобієніе. Достойна вниманія скорость, съ какою впрыскиваніе дъйствуєть на

пульсъ; который, бывъ вовсе уже неощутительнымь, теперь снова ощущается на рукахъ. По истечени времени, потребнаго для впрыскивачнія четырехъ унцій соляной жидкости, вообщеможно довольно явственно считать вульсъ за если впрыснуто уже около трехъ фунтовъ жидкости, то пульсъ оказывается въ довольно хогрощемъ состояніи, хотя не ръдко остается еще слабымъ, и можетъ быть, скорымъ

- 2) На корчи. Какъ скоро пульсъ приходилъ въ хорошее состояніе, то корчи тотчасъ прекращались, и только изредка тревожили больваго снова. Въ многихъ случаяхъ, казавшихся намъ безнадежными, по причинъ преклонныхъ льтъ больнаго и по изпуренію чрезъ предшедшія страданія, вирыскиваніе производимо было съ тою только цьлью, чтобы облегчить мучительныя боли, возбуждаемыя корчами.
- 4) На температуру тъла. Вліяніе вирыскиваній на животную теплоту есть также, большею частію, весьма скорос. Тъло, остававшееся холоднымы теперь согравается, и визсто холоднаго пота является легкая и пріятная испарина.
- 4) На дыханіе и голось. Ослабшее дыханіе вскорь становится крыче. Если впрыснуто около четырехь фунтовъ жидкости, то дыханіе

иногда оказывается болье труднымъ; однакожъ, нри дальнъйшемъ продолжении впрыскичания, припадокъ этотъ исчезаетъ. Слабый голосъ теперь получаетъ естественную громкость.

- 5) На черты лица. По мере возвращения пульса и надлежащей температуры тела, черты лица поправляются. Впавшіе глаза снова полнеють, морщины на лице и темный цесть лица и всего тела, исчезають. Черты лица вообще оживляются, и духъ больнаго ободряется.
- 5) На безпокойство и тягостных ощущенія. Упадокь духа, головокруженіе, шумъ въ ушахъ, давленіе подъ ложечкою, уступаютъ пріятнымъ ощущеніямъ. Неръдко больные, тотчасъ посль впрыскиванія, сидятъ уже въ постели совершенно владъя собою и съ радостію разговаривая о быстромъ переходъ отъ границъ смерти къ жизни.
- 7) На жажду. Самая мучительная жажда, прекращается вскорт послъ того, какъ начато впрыскивание въ вены.
- 8) На отдъление мочи. Вообще, послъ впрыскиванія, отдъленіе мочи вскоръ возвращается. Однакожъ это замьчали мы не такъ часто, какъ другія благопріятныя перемъны:
- 9) На періоди смертельнаго исхода. Вообще

наступленіе сиертельнаго исхода замедлялось иногда несколькими часами, гораздо чаще несколькими днями, даже иногда неделями; а въ некоторыхъ случаяхъ следовало совершенное выздоровленіе. (Principles of Pathology and Practice of Physic. By John Mackintosh. Fourth Edition. 11 Vol. 8. London. 1836.)

## 9.) Чума.

Д. Брайерь, во время девяти-льтняго пребыванія своего въ Константинополь, имьль случай многократно наблюдать тамъ Чуму, и въ недавно изданномъ сочинении сроемъ объ этомъ предметь (Neuf années à Constantinople, observations sur la topographie de cette capitale, l'hygiène et les moeurs de ses habitants, l'islamisme et son influence, la peste, ses causes, ses varietés, sa marche et son traitement; la non-contagion de cette maladie, les quarantaines et les lazarets etc. Par A. Brayer. 11 Vol. 8. Paris. 1836.) выводить, между прочимъ, следующія заключенія: 1) Моисей зналь Чуму и подозръваль въ ней нъчто заразительное. Гомерь постигаль истинныя причины Чумы, и въ краткихъ словахъ представилъ върное изображение опустощительности ея. Геродоть описаль предохранительныя ивры

противъ Чумы, бывшіл въ употребленіи у Египтянь. Наконець Гиппократь наилучше оцениль причины бользни этой, и показаль раціональное леченіе ея. 2) Отъ Фракасторія, весьма заразительное свойство Чумы въ первый разъ провозгласившаго, въ смысле нынъшнихъ Контагіонистовь, до Штолля, т. е. съ 1546 до 1777 года, Врачи имъли совершенно неправильное понятіе о Чумъ, а также и лечили эту бользнь нераціонально. 3) Врачи, сопровождавшіе Французскую Экспедицію въ Египеть, и имъвшіе случай наблюдать Чуму, во всехъ ея видакъ, только нъсколько усовершенствовали леченіе бользни этой, переписанное позднъйшими сочинитслями почти до слова. 4) Не большое число писателей (какъ-то: Штолль, Ассалини, Макъ-Линь и н. др.), обнаружившихъ противное общепринятому мнъніе, также не исправило Терапію бользии этой. 5) Довольно правильная эпоха появленія Чумы, сопровождаемой южными вътрами и туманами, большая или меньшая продолжительность этой язвы, постепенное возрастаніе ея, періоды ожесточенія ея, или наибольшей смертности, наконець, постепенное или быстрое прекращение ея, смотря по слабымъ или сильнымъ вътрамъ, дующимъ съ съ-

вера, — всь эти обстоятельства придають Чунь характерь эпидемін, зависящей отъ переманы температуры и извъстной норчи воздуха. 6) Эта порча дъйствуетъ на жителей Константинополя, по марь силы ея, точно такъ, какъ Сирокко оказываеть вліяніе свое на жителей Сицилін, Неаполя и Рима. 7) Это дъйствіе обнаруживается въ каждой особь различно, смоттря по ея предрасноложению, роду жизни, предразсудкамъ и проч. 8) Въ Чумъ могутъ быть различаемы сльдующіе оттынки: ашта тіпог, анга тајог, доброначественная, злокачаственная и совершению смертельная 9) Такъ назыв. воспалительные, желчные, гиилостные, адинамические виды Чумы зависять отъ индивидуальности темперамента; названіе же «Proteus» происходить оть одного только. сопряженія съ прежнею бользнію, отъ прежнихъ или новыхъ органическихъ разстройствъ, или отъ появленія какой-либо эпидеміи вмысть сь Чумою. 10) Принадки Чумы принадлежать также и нъкоторымъ другимъ бользиямъ; однако вскорь присоединяется къ нимъ недвижимый, блестящій, какъ бы огненный взгядъ больнаго, подобный тому, который замьчается Гидрофобіи. 11) Горячка чумная всегда имъетъ

typum continuum, съ вечерними ожесточеніями. 12) Переломы, сопровождающіе потъ, кровотеченіе, мочу съ осадкомъ, часто встрычаются и бывають благополучные; но за обильными испражненіями кищечными вообще сладуеть неблагополучный исходъ. 13) Иногда бользнь эта, по видимому, уже утихшая, снова ожесточается, весьма быстро убиваеть множество людей, и потомъ совершенно исчезаетъ. 14) Во время свирепствованія Чумы, многія бользни, некоторыми припадками своими сближающияся съ Чумою, признаются за самую Чуму. 15) Предохранительный мары ограничиваются строжайшимъ выполненіемъ правиль Гигіены. Отделеніе больныхъ людей отъ здоровыхъ есть мъра полезная, но не вполнъ надежная. — 16) Встръчаются прижъры излеченія Чумы одною только цвлительною силою натуры. Отъ Чумы, за исключеніемъ высочайшей степени эпидеміи этой, выздоравливаетъ гораздо больщее число больныхъ, нежели отъ такъ назван. въ прежнее время, гнилостныхъ и элокачественныхъ горячекъ, которыя лечимы были раздражающими средствами; и чамъ болье будутъ Чуму лечить противувоспалительными средствами, тъмъ большее будеть число выздоравливающихъ. 17) У

особъ, умирающихъ не тотчасъ, но послъ втораго дня бользни, открываются разстройства въ органахъ пищеваренія и въ оболочкахъ мозга. 18) Общее распознаваніе, или опредъленіе предвъстниковъ Чумы, столько же трудно, сколько, напротивъ, легко индивидуальное распознавание. Опредвленіе предсказанія весьма удобно, и планъ леченія зависить отъ прежняго состоянія здоровья особы забольвшей и отъ силы эпидемін этой. 19) Въ продолженіе одной и той же эпидеміи, возврать бользни рыдко встрычается, но почти всегда бываеть смертельный; возврать послв должайшихъ сроковъ часто бываетъ, и даже четырнадцать разь замычень у той же особы. 20) Число бользней, въ прежиее время признанныхъ заразительными, весьма уменшилось, и ежедневно уменшается, по мъръ усовершенствованія искуства наблюдать. 21) Смертность между Госпитальными прислужниками и между лицами, охраняющими корабли и окуривающими пожитки путешественниковъ, не состоить ни въ какомъ отношени къ опасности заразы, коей они должны подвергаться. 22) Находятся мъста, гдъ Чума, сама собою, прекращается, не сообщаясь ни лицамъ, ни вещамъ, ближайшимъ; но находятся также мъста, гдъ Чума попеременно переходить изъ одной окрестности въ другую; равно находятся мъста, где она тенерь вовсе не появляется, хотя, въ прежнее время, она тамъ часто и сильно свирепствовала; наконець, находятся мъста, где Чума, не смотря на частое сообщение съ Турцією и не взирая на оовершенный недостатокъ медико-полицейскихъ постановленій, вовсе не оказывается. 23) Ни прямое, ни непрямое, прикосновение не оказываетъ вліянія на распространеніе бользни этой.

## 10.) Огнестръльныя раны.

На раны, причиняемыя выстреломь изъ орудій, заряженных только порохомъ, или дробью, и двиствующихь въ небольшомъ разстояніи, досель Врачи обращали весьма малое вниманіе. Въ новъйшее время, только Меніеръ и Дюпьитрень занимались этимъ предметомъ. Нькоторые судебно-медицинскіе случаи, порученные Г. Лашеву (Annales d'Hygiène publique. Avril. 1836. No. 30.) для разрышенія, побудили его къ обстоятельныйшему производству опытовъ надъ трупами. Основываясь на этихъ опытахъ, онъ составилъ нижесльдующія замычанія: 1) если выстрелъ изъ орудія, дробью заряженнаго, происходить въблизкомъ разстояніи, такъ что за-

рядъ: нимало не распадается: то выстръль такой причиняеть гораздо большее и общирныйшее повреждение, нежели выстрыль изь орудія, заряженнаго пулею. 2) Чтобы выстрыть однинь только порохомъ глубоко проникнулъ и причиниль рану, по наружности сходную съ раною, иронзведенною чрезъ выстрълъ дребью: то необходимымъ для этого условіемъ есть: большая величина и толщина (calibre) огнестръльнаго орудія, сильный зарядь и выстрыль въ разстояніи, по крайней мъръ, на месть дюйновъ отъ поражаемаго предмета. 3) Чтобы зарядъ дробью нроизвель одну, круглую, правильную рану, то для этого нужно разстояние не больше какъ отъ 10 до 12 дюймовъ. Если же разстояние превышаетъ одинъ фунтъ, или 18 дюйновъ, то края раны, причиненной дробью, болье или менье разрываютси. При разстояніи, простирающемся до трехъ футовъ, отверстіе раны бываеть уже вовсе не Проиежутки раны покрываются центральное. дробинами, тамъ болъе удаленными одна отъ другой, чъмъ большее было разстояніе, чъмъ хуже огнестръльное орудіе, чъмъ слабъе зарядъ. 4) Если поражавное тело будеть не нагое, по одътое, то для произведенія подобныхъ последствій потребуется еще меньшее разстояніе, и

притомъ тъмъ меньщее, чъмъ многочислениве и плотиве будеть одъяніе,

#### 11,) Canz.

Касательно излечения Сапа, досель ны имъотр даотнар диминельных фактовь, что всякое наблюдение, въ семъ родъ, должно считать важнымъ. Съ этою пълію Г. Томпсонъ (Gazette medic. 1837. No. 42.) сообщаеть сльдующій случай: бользнь, обнаружившаяся у лошади, была признана за Сапъ Ветеринарами, лечившими животное, и уже значительно усилилась; полость ноздрей покрылась язвами, нодчелюстным жельзы разпухли. Всв, употребляемыя въ Сапъ, средства были исвытаны безусившно; животное такъ ослабло, что едва держалось на ногахъ, и было приговорено къ смерти. Въ таковомъ уже состояни, желая испытать дъйствіе іода, Т. приказаль конюху, отъ 3 до 4 разъ въ день, давать этой лошади во 150 капель іодиновой тунктуры съ водою. Леченіе это продолжалось до 6-ти недъль, въ продолжение конкъ никогда не давали менъв **45**0 капель въ день, а часто отъ 500 и до 600. Спасительное дъйствіе лекарства обнаружилось весьма скоро, и въ 7-мь недъль животное почти вполит выздоровьло. Посль излечения ем прошло

1

теперь четыре года; и во все это время, не было замьтно ни мальйшаго возврата бользни.
12. Погребение живаго человика, по его желанию,

и отрытіе могилы чреж мльсяць.

Примъчательной случай этотъ, заимствованный изъ издаваемаго въ Калкуттъ Jndia medical Journal, описанъ Инженеръ-Поручикомъ Боало, который, во время сего произшествія, быль тамъ. Описываемый здъсь человькъ имьеть около 30 лать; онь неоднократно уже соглашался на погребение себя, на нъсколько недъль, и даже иссяцевь, за условную плату. Утверждають, что онъ пріучиль себя задерживать дыханіе, затворяя роть, и закрывая языкомъ заднее отверстіе ноздрей; за нъсколько дней предъ погребеніемъ, онъ не употребляль никакой твердой пищи, за симъ его клали въ колстинный мъщокъ, и опускали въ погребъ, обдъланный внутри деревомъ. На послъднее, описываемое здъсь, погребение онъ согласился по прозьбъ Индійскаго владътеля (Maharwal), чтобъ доставить ему Насладника престола. Человъка этого заключили въ каменную гробницу, въ 12 футовъ длины и 8 ширины; въ углубленій, нарочно сдъланномъ въ нажней части гробницы, въ 3 фута длины и 21/2 шири-

ны, онъ быль общить сукномь и положень въ сидячемъ положении съ сложенными руками и ногами; два большіе камня, въ 6 футовъ длиною, были навалены на могилу, и сверху засыпапы землею. Для отвращенія какого-либо обмана, съ его стороны, къ гробницъ приставлена стража. По окончаніи мъсяца, отрыли могилу, и нашли этого человъка въ безчувственномъ положеній, съ закрытыми глазами, сложенными руками, съ втянутымъ животомъ; зубы были сжаты столь плотно, что съ трудомъ могли растворить ротъ жельзнымъ инструментомъ, для пропущенія насколькихъ капель воды. Мало по малу онъ началъ приходить въ чувство и шевелиться, а скоро потомъ совершенно очувствовался. Поручикъ 5-го полка легкой Кавалеріи Макнагтень, въ Покурь, дълалъ опытъ надъ долгимъ воздержаніемъ этого человъка отъ шищи: его заколотили въ деревяный ящикъ, который повъсили потомъ къ потолку, и онъ находился въ ономъ, въ продолжение 13 дней. — Впрочемъ, случай этотъ такъ важенъ, что, безъ другихъ достовърнъйшихъ доказательствъ, не легко можно ручаться за подлинность ero. (Revue médicale. Juillet 1837.)

### IX.

#### РАСПОРЯЖЕНІЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА.

Г. Военный Министръ, отъ 6-го Октября сего года, предложилъ Медицинскому Департаменту, что составленную въ ономъ Табель порцій, определенных въ Госпиталяхъ для цьинготныхъ больныхъ, Военный Совътъ положилъ утвердить, и что государь императоръ, въ 24 день прошедшаго Севтября, изволилъ одобрить ноложение Военнаго Совъта.

Медицинскій Департаменть нужнымъ счель означенную табель напечатать въ Военно-Медишинскомъ Журналь, для общаго свъдънія и надлежащаго, въ потребивих случаяхъ, исполненія.

## X.

and the second of the second

ОФФИЦІАЛЬНЫЯ ИЗВЪСТІЯ, СЪ 1-го АПРЬЛЯ ПО 1-е ПОЛЯ 1837 ГОДА.

the second and all are mission in again

# `1.) Вновь поступивше въ службу.

Изъ вольнопрактикующихъ: Дэктора Медиция ны: Эттингенъ, въ Якутскій пахотный полкъ баталюннымъ Лекаремъ, Пипесъ, въ Кишеневскій военный Госпиталь Ординаторомъ ; Лекарис, 1-го Отдъленія: Преображенскій, Лейбъ-Гвардін въ Егерскій полкъ баталіоннымъ Лекаремъ, Крейцъ, въ Отдъльный Кавказскій Корпусъ, Сахаровъ и Убиновъ, въ плазное отдъление Санктнетербургскаго военно-сухопутнаго Госпиталя; 2-го Отдиленія: Гудинь — Левковичь, въ Суздальскій пъхотный полкъ баталіоннымъ Лекаремъ, Калашниковъ, въ Пермскій военный Госпиталь Ординаторомъ; 3-го Отдъленія: Кондратовичь, въ: Отдельный Кавказскій Корпусъ, Пашковскій, въ Вознесенскій военный Госпиталь Ординаторомъ, Рукуйжа, въ Ковенскій

военно-временный Госпиталь Ординаторомъ.—

Изъ отставныхъ: Штабъ-Лекарь Коллежскій Ассесоръ Ладонка, въ 18-10 Артиллерійскую бригаду старшимъ Лекаремъ, Штабъ-Лекарь Статскій Совътникъ Дроссардъ, въ Люблинскій военный Госпиталь Ординаторомъ, Штабъ-Лекарь Барановскій, въ Невскій морской полкъ баталіоннымъ Лекаремъ. Изъ Гражданскаго въдомства: Штабъ-Лекарь Титулярный Совътникъ Пронинъ, въ Новоархангельскій Уланскій полкъ младшимъ Лекаремъ, Докторъ Медицины и Хирургін Надворный Совътникъ Пецулевичь, въ Санктпетербургскій Жандармскій дивизіонъ, Лекарь Лахманъ, въ Севастопольскій военный Госпиталь Ординаторомъ.

# 2.) Производство въ ученыя званія.

Въ Доктора Медицины: Исправляющій должность Доктора при Генераль Штабъ-Докторь дъйствующей армін, Штабъ-Лекарь Коллескій Совътникъ Васильевъ, Ординаторъ Варшавскаго военнаго Госпиталя Штабъ-Лекарь Коллежскій Ассесоръ Загоровскій. Въ Медико-Хирурги: Старшій Лекарь Гельзинфорскаго военнаго Госпиталя Штабъ-Лекарь Надворный Совътникъ Зальцианъ, Ординаторы Ораніенбаумскаго военнаго Госпиталя Лекари: Стеткевичь и Щегловъ. Въ Штабъ-Лекари: младшій Лекарь 15-й Артиллерійской Бригады Титулярный Совътникъ Дагаевъ, баталіонный Лекарь Астраханскаго Карабинернаго полка Вакаръ, 5-го баталіона Рязанскаго пъхотнаго полка Рябининъ, Финляндскаго линейнаго No 12-го баталіона Титулярный Совътникъ Каменевъ, Ординаторъ Ревельскаго Госпиталя Клиндеръ, Динаминдской военнаго кръпости Келеръ, Грузинскаго линейнаго No 5-го баталіона Павловскій, баталіонный Лекарь Апшеронскаго пъхотнаго полка Титулярный Совътникъ Витвенскій, младшій Лекарь Л.-Гв. Сапернаго баталіона Агламазовъ, полковый Штабъ-Лекарь Якутскаго пъхотнаго полка Титулярный Совътникъ Шрейберъ; въ Лекари: Кандидаты Медицины и Хирургіи Ординаторы военныхъ Госпиталей: Могилевско-Бълорусскаго Новиковъ и Бомборскаго Волковъ.

#### 3.) Производство въ чины.

За выслугу льтъ произведены въ Надворные Совътники Коллежскіе Ассесоры: Докторы Медицины: Московскаго Жандармскаго дивизіона Грушинскій, 5-го баталіона Селенгинскаго пъхотнаго полка Пыпинъ, баталіонный Лекарь Днъпровскаго пъхотнаго полка Беренсъ, полко-

вый Штабъ-Лекаръ Л.-Гв. Егерскаго полка Садовскій, старшій Лекарь Виленскаго военнаго Госпиталя Видовскій, Рижской крыпости Блюменталь, старшій Лекарь Гродненскаго военнаго Госпиталя Симони, Штабъ-Лекари: дивизіонный Докторъ 2-й Гренадерской дивизіи Синицынъ; старшіе Лекари: 3-го Сапернаго баталіона Гриммъ, Кабардинскаго Егерскаго полка Гиъвашевъ, Екатеринославскаго военнаго Госпиталя (при фабрикъ) Соборновъ, Тифлисскаго военнаго Госпиталя Герарди, Госпиталя Округа No 5-го пахатныхъ солдатъ Кулаковъ, Новоархангельскаго Уланскаго полка Вележевъ, младшій Лекарь Ижевскаго оружейнаго завода Имшенецкій, Ординаторы: Екатеринославкаго военнаго Госпиталя (при фабрикъ) Богушевичь, Новогеоргіевскаго военнаго Госпиталя Кондонъ, Брестъ-Литовскаго военнаго Госпиталя Кириловичь, Гродненскаго военнаго Госпиталя Костровъ, Варшавскаго военнаго Госпиталя: Бълинскій, Рейхъ, Бъляевъ, Новогеоргіевскаго военнаго Госпиталя Фроловъ, Архангельскаго военнаго Госпиталя Тихомировъ, Хер-Госпиталя Клязмогорскій, сонскаго военнаго Тифлисскаго военнаго Госпиталя Тимофеевъ, Диитріевскаго военнаго Полугоспиталя Сергьевъ, старшіе Лекари: Гусарскаго Его Величе-

ства Короля Виртембергскаго полка Левинцевъ, Ольвіопольскаго Уланскаго полка Малицкій, Госпиталя 1-го Кавалерійскаго округа Украинскаго военнаго поселенія Вареновъ, 3-й полевой Артиллерійской бригады Гольцеймеръ, подвижнаго запаснаго парка 4-й полевой Артиллерійской бригады Цыприновичь, старшіе Лекари полевыхъ Артиллерійскихъ бригадъ: 7-й Цитовичь, 16-й Сербинъ, полковой Штабъ-Лекарь Украинскаго Егерскаго полка Погоръльцовъ, старшій Медикъ 4-й легкой Кавалерійской дивизін Пальцевъ, Ординаторъ Госпиталя 1-го. Кавалерійскаго округа Украинскаго военнаго поселенія Софистовъ, старшій Лекарь 3-го резервнаго Сапернаго баталіона Мерцаловъ, полковый Штабъ-Лекарь Л.-Гв. Измайловскаго полка Ивановъ и линейнаго Оренбургскаго No 2-го баталіона Соколовъ. Въ Коллежскіе Ассесоры: Штабъ-Лекари: Ординаторъ Екатериноградскаго военнаго Госпиталя Соловьевъ, старшій Лекарь Георгіевскаго военнаго Госпиталя Крупицкій, старшій Лекарь Витебскаго военнаго Госпиталя Володьзко, Ординаторъ Екатеринодарскаго вовоеннаго Госпиталя Гейдушекъ, старшій Лекарь 1-й Гренадерской Артиллерійской бригады Васильевъ, полковый Штабъ-Лекарь Гренадерска-

Принца Евгенія Виртембергскаго полка Дмитровскій, старшій Лекарь 3-го Учебнаго Карабинернаго полка Голубовскій, состоящій въ отдыльномъ Кавказскомъ Корпусъ Никифоровъ, Ординаторы военныхъ Госпиталей: Кіевскаго Зиновьевъ, Брестъ-Литовскаго Волченецкій, Рижскаго Гагеманъ, Житомирскаго Голубовскій, полковый Штабъ-Лекарь пъхотнаго Генералъ-Фельдмаршала Князя Варшавскаго Графа Паскевича-Эриванскаго полка Бауманъ, Брянскаго Арсенала Пронскій, Кубанскаго козачьяго полка Всесвяцкій, дивизіонный Докторъ резервной дивизіи 3-го пъхотнаго Корпуса Маторинъ и Штабъ-Лекарь Днъпровскаго пъхотнаго полка Андреевъ. Въ Титулярные Совътники: Лекари 1-го Отдъленія, баталіонные Лекари полковъ: Гренадерскаго Наслъднаго Принца Прусскаго Журавкевичь, пъхотныхъ: Староингерманландскаго Миньковскій, Азовскаго Бергау и Мстиславскій, Дивпровскаго Розовъ, 5-го баталіона Екатеринбургскаго пъхотнаго полка Вознесенскій, младшій Лекарь Клястицкаго Гусарскаго полка Фонъ-Барановъ, баталіонные Лекари полковъ: Прагскаго пъхотнаго Лашкевичь, Елецкаго Гришачковъ, 5-го баталіона Рязянскаго пъхотнаго Штабъ-Лекарь Рябининъ, баталіонные

Лекари полковъ: Алексапольскаго Егерскаго Гребинскій, Томскаго Егерскаго Дмитревскій, Украинскаго Егерскаго Ширяевъ, Мингрельскаго Егерскаго Красноглядовъ, Копорскаго Егерскаго Клебановскій, 5-го баталіона Тарутинскаго Егерскаго полка Третьяковъ, Ординаторъ Дубенскаго военнаго Госпиталя Уляницкій, баталіонные полковъ: Грузинскаго Гренадерскаго Кедроливанскій, Л.-Гв. Семеновскаго Григоровичь, младшіе Лекари: Ольвіопольскаго Уланскаполка Базилевичь, 1-го Конно-піонернаго эскадрона Деньговъ, Чугуевскаго Уланскаго полка Константиновичь, Вознесенского Уланского полка Тутевичь, Ординаторы военныхъ Госпиталей: Ловичскаго Породия, Замостскаго Шумахеръ, Смоленскаго Ковалевъ, Кіевскаго Смородиновъ, 2-го полка Астраханскаго козачьяго войска Флеровъ, младшіе Лекари: Конно-Артиллерійской легкой № 18 батареи Дьяконовъ, Л.-Гв. 2-й Архиллерійской бригады Архиповъ, 3-й полевой Артиллерійской бригады Штабъ-Лекарь Скибинскій, подвижнаго запаснаго парка 11-й полевой Артиллерійской бригады Владимірскій, младшій Лекарь 12 полевой Артиллерійской бригады Ковалевъ, Ординаторъ Рижскаго военнаго Госпиталя Штабъ-Лекарь Тонсонъ, млад-

шій Лекарь 16-й полевой Артиллерійской бригады Штабъ-Лекарь Андреевъ, баталіонный Леларь, Гренадерскаго Наслъднаго Принца Оранскаго полка Пушкаревъ, Какбетскаго военнаго Лазарета Мобицъ и Грузинскаго линейнаго No 5-го баталіона Павловскій; Лекари 2-го Отдоленія: 5-го баталюна Якутскаго пъхотнаго полка Милоглядовъ, баталіонный Лекарь Астраханскаго Карабинернаго полка Штабъ-Лекарь Вакаръ, иладшій Лекарь Орденскаго Кирасирскаго полка Кротковъ, баталіонный Лекарь Низовскаго Егерскаго полка Томашевскій, Скопинскаго военно-конскаго завода Мессершимидтъ, младшій 1-й полевой Артиллерійской бригады Бълинскій, 5-го баталіона пъхотнаго Принца Карла Прусскаго полка Двораковскій, 5-го округа пахатныхъ солдатъ Штабъ-Лекарь Витлокъ, младшій Лекарь Оренбургскаго Уланскаго полка Штабъ-Лекарь Заіончковскій, 5 баталіона Елецкаго пьхотнаго полка Цвьтковъ, округовъ пахахатныхъ солдатъ: No 10-го Золотаревъ, No 14 Кикинъ, Ординаторы военныхъ Госпиталей: Гродненскаго Сулиманъ-Грудзинскій, Бълостокскаго Лондкевичь, баталіонные Лекари полковь: Костромскаго Егерскаго Данненбергъ, Ладожскаго Егерскаго Аристовъ, Невскаго Морскаго

Орловъ, 5 баталіоновъ полковъ: Капорскаго Егерскаго Виноградовъ, Невскаго Морскаго Сочавець, баталіонный Лекарь Галицкаго Егерскаго полка Воскресенскій, 5 баталіона Егерскаго Фельдмаршала Князя Кутузова-Смоленскаго полка Толкачь, баталіонные Лекари полковъ: Замосцскаго Егерскаго Заіончковскій, Вологодскаго пъхотнаго Крыловъ, Конно-Артиллерійской легкой № 17-го батереи Кроль, Черноморскаго линейнаго № 9 баталіона Яковенко, баталіонные Лекари пъхотнаго Генералъ-Фельдмаршала Князя Варшавскаго Графа Паскевича Эриванскаго полка: Левковичь и Ярмаковскій, полковый Штабъ-Лекарь Азовскаго пъхотнаго полка Милляртъ, Очаковскаго военнаго Лазарета Васильевскій, баталіонный Лекарь Симбирскаго Егерскаго полка Величковскій, младшій Лекарь 1-го Учебнаго Карабинернаго полка Захаровъ, 6 округа пахатныхъ солдатъ Медико-Хирургъ Лебедевъ, 5 баталіоновъ полковъ: Муромскаго пъхотнаго Боровиковскій, Ствскаго пъхотнаго Казанскій, Алексопольскаго Егерскаго Гаевскій, Тульскаго Егерскаго Кремеръ, баталіонный Лекарь Гренадерскаго Принца Фридериха Нидерландскаго полка Чернявскій, Ординаторы военныхъ Госпиталей: Фанагорійскаго Бобровичь и

Житомирскаго Рошковскій; 3-го Отдъленія: Ординаторы военныхъ Госпиталей: Екатериноградскаго Правдинъ, Моздокскаго Киселевъ, Хоперскаго линейнаго козачьяго полка Поповъ, 5-го баталіона Новоингерманландскаго прхотнаго полка Карижинъ, баталіонные Лекари пъхотныхъ полковъ: Архангелогородскаго Ордынецъ, Олонецкаго Гринъ, Конно-Артиллерійской легкой No 19 батареи Ничипоровичь, полковый Штабъ-Лекарь Якутскаго пъхотнаго полка Шрейберъ, Ординаторъ Тираспольскаго военнаго Госпиталя Глажевскій, баталіонные Лекари полковъ: Костромскаго Егерскаго Юденичь, Шлиссельбургскаго Егерскаго Браше, Тобольскаго пъхотнаго Станкевичь, Низовскаго Егерскаго Мигринъ, Ординаторъ Ревельского военного Госпиталя Штабъ-Лекарь Клиндеръ, подвижнаго запаснаго парка 8-й полевой Артиллерійской бригады Червинскій, баталіонный Лекарь Витебскаго Егерскаго полка Беръ 2-й и Грузинскаго линейнаго № 4-го баталіона Нрицпуховъ.

4.) Опредъление Медицинскихъ Чиновниковъ на высшія мъста.

Дивизіонными Доктороми въ 23 пехотную дивизію полковый Штабъ-Лекарь Украинскаго Егерскаго полка Штабъ-Лекарь Надворный Совътникъ Погоръльцевъ. Старшими Докторами: въ Старорусскій военный Госпиталь старшій Лекарь онаго Госпиталя Штабъ-Лекарь Статскій Совътникъ Ламовскій, въ Бомборскій военный Госпиталь Ординаторъ Тифлисскаго военнаго Госпиталя Штабъ-Лекарь Коллежскій Советникъ Белявскій, въ округи пахатныхъ солдать: Новгородской, Витебской и Могилевской Губерній, исправляющій должность дивизіоннаго Доктора округовъ пахатныхъ солдатъ Новгородскаго и Старорусскаго удъловъ Штабъ-Лекарь Статскій Совьтникъ Корицкій. Старшими Лекарями: въ Самогитскій Гренадерскій полкъ баталіонный Лекарь Симбирскаго Гренадерскаго полка Штабъ-Лекарь Вишневскій, въ Невскій Морской полкъ баталіонный Лекарь Симбирскаго Егерскаго полка Штабъ-Лекарь Пальминъ, Л.-Гв. въ Егерскій полкъ баталіонный Лекарь онаго же полка Докторъ Медицины Коллежскій Ассесоръ Садовскій, въ Елисаветградскій Уланскій полкъ младшій Лекарь Новоархангельскаго Уланскаго полка Штабъ-Лекарь Коллежскій Ассесоръ Затлеръ, въ Потійскій военный Госпиталь Штабъ-Лекарь Грузинскаго линейнаго № 6-го баталіона Жураковскій, въ

1-ю Конно-Артиллерійскую бригаду младшій Лекарь 2-й Конно - Артиллерійской бригады Штабъ-Лекарь Соколовъ, въ Навагинскій пъхотный полкъ баталіонный Лекарь того же полка Штабъ-Лекарь Валицкій, въ 7-ю Конно-Артиллерійскую бригаду Ординаторъ Старорусскаго военнаго. Госпиталя Штабъ-Лекарь Сезентовичь, въ Гренадерскій Наслъднаго Принца Прусскаго полкъ баталіонный Лекарь онаго же полка Штабъ-Лекарь Родосскій.

#### 5.) Награды.

За отлучно-усердную и ревностную службу Всеми лостивьйше награждены Чинами: Дъйствительнаго Статскаго Совътника: Исправляющій должность Директора Медицинскаго Департамента Военнаго Министерства Лейбъ-Хирургъ Двора ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, Медико-Хирургъ, Статскій Совътникъ Тарасовъ, съ утвержденіемъ въ сей должности; Коллежскаго Ассесора: состоящій при Новороссійскомъ и Бессарабскомъ Генералъ-Губернаторъ, дивизіонный Докторъ, Докторъ Медицины Андреевскій, старшій Лекарь Госпиталя 6-го Кавалерійскаго округа Украинскаго военнато поселенія Штабъ-Лекарь Кривецкій. Орденами: Св. Станислава З-й степени: старшій Леми

карь 18-й Артиллерійской бригады Штабъ-Лекарь Коллежскій Ассесоръ Ладонка; того же Ордена 4-й степени: баталіонные Лекари: Грузинскаго Гренадерскаго полка Лекарь Ждано-Навагинскаго пъхотнаго полка Лекарь Рафановичь, Кабардинскаго Егеркаго полка Лекарь Дейбель, полковый Штабъ-Лекарь Тенгинскаго пахотнаго полка Штабъ-Лекарь Коллежскій Ассесоръ Озеровъ; денежным награжденіемь: Главный Медикъ дъйствующей Армін Коллежскій Совътникъ Четыркинъ, Ординаторы военныхъ Госпиталей, Штабъ - Лекари: Житомирскаго Коллежскій Ассесоръ Кобыляцкій, Тифлисскаго Дроздовъ, 2-го Кавалерійскаго округа Украинскаго военнаго поселенія Гаврильцовъ; а Штабъ-Доктору Отдъльнаго Оренбургскаго Корпуса Доктору Статскому Совытнику Бидерману Всемлостивыйше пожаловано добавочное жалованье по 1000 руб., въ годъ. За выслугу льть въ военно-медицинскомь выдомствы назначена на службы пенсія: Ординатору С. Петербургскаго военно-сухопутнаго Госпиталя Штабъ-Лекарю Статскому Совътнику Элькану 1500 руб., старшему Доктору Бомборскаго военнаго Госпиталя Штабъ-Лекарю Коллежскому Совътнику Бълявскому 1200 руб.,

Штабъ-Доктору 1-го пъхотнаго Корпуса Штабъ-Лекарю Статскому Совътнику Багинскому 1000 руб., дивизіонному Доктору 20-й пъхотной дивизін Штабъ-Лекарю Коллежскому Совътнику Земскому и Штабъ-Лекарю Казанскаго пороховаго завода Коллежскому Совътнику Кочкину, по 800 руб, дивизіонному Доктору резервной дивизін 6-го птхотнаго Корпуса Штабъ-Лекарю Надворному Совътнику Суворову и Штабъ-Лекарю легкихъ батарей № 7, 8 и 9 Конно-Артиллерійскаго резерва Надворному Совътнику Мамяревскому, по 450 руб., старшимъ Лекарямъ Артиллерійскихъ бригадъ Штабъ-Лекарямъ, Колежскимъ Ассесорамъ: Кавказской Гренадерской Гросшупфу и 18-й полевой Ладонкъ, по 400 руб. въ годъ.

### 6.) Увольнение от службы.

Состоявшій при Генераль-Фельдмаршаль Князь Сакень, Докторь Медицины и Хирургіи, Дьйствительный Статскій Совьтникь Успенскій, съ пенсіономь, Ординаторы: Казанскаго военнаго Госпиталя Штабъ-Лекарь Коллежскій Совьтникь Шрейберь, Екатеринославскаго военнаго Госпиталя (при фабрикь) Штабъ-Лекарь Надворный Совътникъ Богушевичь, съ мундиромъ и пенсіономъ, Ординаторъ Тираспольскаго военнаго

Госпиталя Штабъ-Лекарь Рудзинскій, полковый Штабъ-Лекарь Самогитского Гренадерского полка Штабъ-Лекарь Величковскій, Ординаторъ С. Петербугскаго военно-сухопутного Госпиталя, Докторъ Медицины и Хирургіи, Нароновичь 2-й, Ординаторъ Госпитальнаго отдъленія, учрежденнаго въ домъ купца Эгермана, Докторъ Медицины, Коллежскій Совътникъ Тихановичь, Ординаторъ Московскаго военнаго Госпиталя, Докторъ Медицины, Надворный Совътникъ Дрейеръ, Штабъ-Лекарь 5 баталіона Тобольского пвхотнаго полка Левинскій: а Ординаторъ польскаго военнаго Госпиталя Медико-Хирургъ Коллежскій Ассесоръ Барановъ исключенъ въ Гражданское въдомство; Лекарь Л.-Гв. Гарнизоннаго баталіона Травлинскій перемъщенъ въ Гатчинскій Воспитательный домъ; Докторъ Медицины С. Петербургскаго Жандармскаго дивизіона Коллежскій Ассесоръ Корнеліусъ поступиль въ должность старшаго Врача при воспитательномъ Обществъ благородныхъ дъвицъ.

#### 7.) Умершіе.

Ордипаторъ Килійскаго военнаго Госпиталя Лекарь Богольповъ, баталіонный Лекарь Люблинскаго Егерскаго полка Лекарь Ивановъ, Ординаторъ Кіевскаго военнаго Госпиталя Штабъ-

Лекарь Статскій Совътникъ Велланскій, баталіонный Лекарь пъхотнаго Генералъ-Фельдмаршала Киязя Варшавскаго Графа ПаскевичаЭриванскаго полка Лелкарь Николаенко, дивизіонный Докторъ 23-й пъхотной дивизіи ШтабъЛекарь Коллежскій Совътникъ Орловъ, Лекарь
Черноморскаго линейнаго No 9-го баталіона
Титулярный Совътникъ Яковенко, баталіонный
Лекарь Тобольскаго пъхотнаго полка ШтабъЛекарь Фалькмаръ, старшій Лекарь Душетскаго всеннаго Госпиталя Штабъ-Лекарь Юркевичь, баталіонный Лекарь Литовскаго Егерскаго полка Лекарь Птицынъ.

### 8.) IIImpagis,

Ветеринарный Помощникъ перваго отдъленія Страшниковъ, за нетрезвое поведеніе и буйные поступки, по Высочлише утвержденной конойрмаціи военнаго Суда, лишенъ званія Ветеринарнаго Помощника перваго отдъленія и присвоенныхъ званію сему правъ и преимуществъ 14-го класса, съ написаніемъ въ рядовые.

#### XI.

#### ОБЪЯВЛЕНІЕ.

#### А) Новыя сочинения.

1) Зоофармакологія или наука о лькарствахь, употребляемыхь для домашнихь животныхь, при бользняхь имь приключающихся, составленная, для руководства при пренодаваніи понятій о семь предметь и проч., Ординарнымь Профессоромь Императорской С. Петербургской Медико-Хирургической Академіи, Статскимь Совьтникомь и Кавалеромь Петромь Лукинымь. Санктпетербургь. 1837. 8.

Содержаніе. Предисловіе (заключающее въ себв Исторію Зоофармакологіи). Общіл понятія о Зоофармакологіи. Поясненіе видовъ лькарсть для внутренняго употребленія. Поясненіе видовъ лькарствъ, снаружи употребляемыхъ. Поясненіе видовъ лькарствъ, средину между наружными и внутренними занимающихъ. Пріємъ лькарствъ. Врачебныя средства простыя, для животныхъ употребляемыя. Описаніе этихъ стредствъ по

алфавитному порядку, состоящее изъ 122-хъ но-меровъ.

Желающіе имъть эту книгу могуть адресоваться, на имя Автора, въ Медико-Хирургическую С. Пстербугскую Академію. Цъна: четыре рубля, а съ пересылкою пять руб.

2) Desmurgia, seu Chirurgiæ pars de adminiculis deligatòriis. A. Josepho Korzenievsky, Medicinæ Doctore, Cesareæ Academiæ medicochirurgicæ Vilnensis Professore extraordinario etc. Vol 1. Adjectis IX dabulis, in lapide delineatis. Vilnæ. 1837. 8.

Codepocanie. Desmurgiæ definitio, utilitas. Pars 1: De simplicioribus adminiculis deligatoriis. Pars 11. De fasciis, machinis et apparatu deligatorio diverso. Sectio 1. Fasciæ, machinæ et apparatus, qui in curandis vulneribus, ulceribus, fistulis, tumoribus, variisque læsionibus externis, continui solutione distinctis, adhiberi solent. A) Fasciæ capitis. B) Fasciæ, diversaque adminicula, collo adaptanda. C) Fasciæ thoracis, variaque adminicula ad mammarum adfectiones. D) Fasciæ, diversaque adminicula abdominis. E) Fasciæ et vincula pelvis, pudendorum, perinæi atque ani.

Jcones fasciarum, variarumque rerum, quæ primo Desmurgiæ Volumine continentur.

5) De ossibus fractis tractatus in discentium usum. A. Josepho Korzenievsky, Doctore Medicinæ etc. Adjectis XXI tabulis, in lapide incisis. Vilnæ. 1837. 8.

Codepocanie. I. De ossium fracturis generatium. II. De ossium fracturis speciatim.

Tabulæ XXI, quibus fasciæ, machinæ et apparatus, in tractatu de ossibus fractis descripti, illustrantur.

Сочиненія, подъ No 2 и 3, можно получать у самаго Автора, въ Виленской Медико-Хируги-ческой Академіи.

4) Ephebei, ad nobilem juventutem in re militari informandam primitus stabiliti, Diatribe physico-jatrica; elaborata Medico primario ejusdem Instituti, Martino Solsky. Petropoli. 1837. 8.

Содержаніе. Sectio physico-medica. Nota historica. Jnstituti ratio. Topographia. Victus. Amictus. Exercitia. Recreatio. Somnus. Non-nullæ institutiones tuendæ prosperæ valetudinis alumnorum. Morborum numerosorum et sæpissime gravissimorum, alumnos Ephebei infestantium, ratio. Sectio nosologico-thera-

peutica. Febres. Exanthemata acuta. Phlogoses. Hæmorrhagiæ. Vesaniae. Nevroses. Secretiones et retentiones morbosae. Morbi haematoseos. Morbi lymphatici. Morbus plasticomucosus. Morbi hectici. Impetigines. Morbi topici, forum Chirurgiae strictius spectantes. Couspectus morborum, a 1832 ad 1837 annum tractatorum.

В) О продолжении народно-врачебной Газеты: Другъ Здравія, въ 1838 году.

Медицинская Газета: Другъ Здравія, существующая пять льть, будеть издаваться въ 1838 году и содержать, по прежнему, статьи, по всьмъ Медицинскимъ наукамъ, Русскихъ Врачей и изъ современныхъ, періодическихъ изданій, сочиненій, получаемыхъ еженельльно почтою, сверхъ того: Библіографію, отечественную и иностранпую, Рецензіи книгъ, Біографіи, Медико-Статистическія свъдънія, заграничныя и отечественныя, извлекаемыя изъ Газетъ, въдомостей и дълъ Медицин. Депар. Мир. внут. Дълъ и засъданія Общества Русскихъ Врачей. Цвна: 15 руб. за годъ, или 5 руб. по третямъ. Адрессъ: въ Редакцію Газеты Другъ Здравія.

Д-ръ К. Грумъ.

# содержаніе

| I. Успъшное перевязаніе arteriae iliacae commu-     |
|---|
| nis, близь раздъленія aortae abdominalis, при       |
| аневризив arteriae iliacae externae произве-        |
| денное Професс. Х. Саломоном                        |
| <del>-</del>  |
| II. Обзоръ бользией, въ войскахъ 7-й пвхот-         |
| ной дивизіи, съ 1-го Ноября 1835 по 1-е             |
| Номбря 1836 года 199-                               |
| Ш. Наблюденіе, о воспаленіи околосердечной          |
| сумки (Pericarditis)                                |
| IV. О производствъ операція камнекрушенія           |
| (Lithotritia) у Арабовъ, въ XII и XIII въкахъ. 224. |
| V. О маликъ, эпизосотической болъзни рогата-        |
| го скота  |
| VI. О благотворномъ дъйствін солянокислаго          |
| золота (Murias auri, aurum muriaticum) въ           |
| застарълыхъ и упорныхъ, венерическихъ               |
| язвахъ,   |
| VII. Военно-Госпитальныя замечанія 248.             |
| /III. Cartice:                                      |
| 1) Слина, въ Физіологическом и Пато-                |
| логическом в отношени 292.                          |
| 2) Голубая люга                                     |
| , -   |
| 3) Срависніє трупоразилній посль тифоз-             |
| ной горягки, въ Доблинъ, Парижть и                  |
| Keyeen 997.   |

| A) Раздражсние спиннаго мозга (Irritatio               |
|--|
| spinalis)  |
| 5) Insolatio   |
| 6) Замъганія о дъйствіи Креозота на                    |
| людей и животных в в в в в в в в в в в в в в в в в в в |
| 7) Разлигіе въ дъйствіи могсеодивих                    |
| средствя на отдъление моги 305.                        |
| 8) Испражнительный способы легенія ти-                 |
| фозных воржень   |
| 9) Incontenentia urinae                                |
| 10) Леченіе Холеры грезь солліныя впрыски-             |
| ванія въ вепы  |
| 11) Чума   |
| 12) Оенестръльныя раны                                 |
| 13) Cans   |
| 14) $m{\Pi}$ огребеніе живаго геловька, по сео         |
| желонію, и отрытіе могилы трезв                        |
| мпьсяць  |
| ІХ. Распоряженія Правительства 322.                    |
| Х. Оффиціальныя извъстія, съ 1-го Апреля по            |
| 1-е Іюдя 1837 года                                     |
| <b>XI.</b> Объявленіе                                  |

Ctpan; lio

. 299. . 500.

а . 502.

rs . 505.

. 306. . 307.

. 308. . 312 . 317.

. 519. 20

. 591 . 592

525. 539.



Google

Österreichische Nationalbibliothek

+Z168748200

